



Noticario Ornitológico

Authors: Molina, Blas, Prieta, Javier, and Lorenzo, Juan Antonio

Source: Ardeola, 58(1) : 193-220

Published By: Spanish Society of Ornithology

URL: <https://doi.org/10.13157/arla.58.1.2011.193>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Blas MOLINA¹, Javier PRIETA² y Juan Antonio LORENZO³ (Canarias)

Como en anteriores entregas, a las citas recibidas habitualmente se han incorporado algunas otras recogidas en distintos foros, así como algunos blogs y páginas web. Agrupan información de unas 158 especies repartidas por toda la geografía nacional. Con el fin de facilitar la labor de recopilación de datos, se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.

CISNE NEGRO

Cygnus atratus

Un individuo en la Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar, Almería, el 24 de abril de 2011 (A. Rubio, A. Pabón, J. Rubio y J. L. García de Castro).

ÁNSAR CARETO

Anser albifrons

Un adulto en el Estany d'Ivars, Lleida, el 19 de noviembre de 2010 (S. Sales). Un ejemplar en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, al menos desde el 1 de enero hasta el 14 de febrero de 2011 (C. Salvá, O. Salvá, A. Torrent, P. Calero, O. Clarabuch, J. Ventura y R. Faura). En el embalse del Ebro, Cantabria, en diciembre de 2010, cuatro aves el día 17 y siete el día 28; un ejemplar el 21 de enero de 2011 (M. Alonso). En la Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila, Zamora, se avista el primer ejemplar el 5 de diciembre de 2010, máximo de 6 aves el 4 de enero de 2011 y cinco individuos el 6 de febrero de 2011; el día 13 de febrero se observan cuatro (A. Rodríguez Sinoivas, E. García Cid, D. Keyte, J. Ruiz, P. Tapia, J. M. San Román, J. Sagardía y otros). En la laguna

de Boada, Palencia, dos aves el 18 de noviembre y tres el 4 de diciembre de 2011 (C. González y A. Salazar). En la laguna de La Nava, Palencia, el primer ejemplar se registra el 13 de noviembre de 2010, cinco aves el 19 de noviembre, y máximos en febrero de 2011 con 20 individuos el día 18, 33 el día 24 y 21 el día 28 (M. T. Antón, J. M. Casas, E. Gómez Crespo, J. A. Casado, J. M. San Román, J. Ruiz y P. Tapia). Dos aves adultas y un ejemplar joven en Capillas, Palencia, el 11 de diciembre de 2010 (D. Martínez Andrade). Un ejemplar en las lagunas de Suzana, Burgos, los días 19 y 20 de noviembre de 2010 (J. L. Lobo). En Los Lavajares, Rámaga, Salamanca, seis individuos el 20 de enero y 12 el 2 de febrero de 2011 (A. González Mendoza). Observaciones en Extremadura: uno el día 7 de febrero (M. Kelsey) y cuatro aves, dos adultos y 2 jóvenes, el día 11 de febrero de 2011, ambas en Moheda Alta, Navalvillar de la Pela, Badajoz (M. Kelsey, G. Schreur y T. Appleton). Otras citas en esta comunidad: un adulto en el embalse de Sierra Brava, Cáceres, el 3 de enero de 2011 (X. Piñero); un juvenil en el embalse de Portaje, Cáceres, los días 26 de enero y 1 y 12 de febrero de 2011 (J. Prieta y S. Mayordomo); cinco aves en Peraleda de la Mata, Cáceres, el 29 de enero de 2011 (S. Mayordomo).

¹ noticiario@seo.org; bmolina@seo.org

² javierprieta@gmail.com

³ jalorenzo@seo.org

En Doñana, un ejemplar en la marisma de Hinojos, Huelva, el 11 de diciembre de 2010 (J. A. Sencianes) y de nuevo un ave con características de la subespecie *albifrons* en la misma marisma, el 14 de diciembre de 2010 (F. Chiclana y F. del Valle). Siete individuos (tres adultos y cuatro juveniles) en Ribadeo, Lugo, los días 6 y 7 de marzo de 2011 (D. Calleja y L. J. Cantil).

ÁNSAR COMÚN

Anser anser

Especie de presencia ocasional en la Comunidad de Madrid: un ejemplar en la laguna de Meco, Madrid, los días 23 y 24 de junio de 2010, y otro ejemplar el 18 de agosto de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH); mientras que en 2011 en el mismo humedal: 48 ejemplares el 6 de febrero, uno el 21 de febrero, 56 el 23 de febrero, dos el 27 de febrero y uno el 18 de marzo (J. L. Aguirre, C. Talabante, A. Aparicio, G. Díaz y A. Larrán/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

BARNACLA CANADIENSE

Branta canadensis

Dos aves en Moheda Alta, Navavillar de Pela, Badajoz, el 19 de diciembre de 2010 (Á. Díaz Pastor). Un ejemplar en la laguna de Ricaldo, Lugo, el 20 de febrero de 2011 (Ó. Llama) y otro en la laguna de La Nava, Palencia, el 26 de diciembre de 2006 (D. Martínez Andrade).

BARNACLA CARIBLANCA

Branta leucopsis

Un ejemplar en el embalse de Trasona, Asturias, los días 2 y 3 de diciembre de 2010 (E. García Sánchez y C. Álvarez). Un individuo en Santoña, Cantabria, al menos entre el 25 de diciembre de 2010 y el 2 de febrero de 2011 (D. González y A. García Herrera). Un grupo de 14 ejemplares en Salburúa, Vitoria, Álava, entre el 4 de diciembre de 2010 y el 9 de febrero de 2011 (L. Lobo, J. C. Andrés y S. de Juan). Grupo de 19 ejemplares en el embalse de Leiva, La Rioja, en diciembre de 2010 (J. Serradilla). En las lagunas de Suzana, Burgos, un ejemplar los días 24 y 25 y dos el día 26

de diciembre de 2010 (J. E. Mateos y D. Martínez Andrade) y de nuevo el 3 de enero de 2011 se vuelve a ver otro ejemplar joven (D. Martínez Andrade). En la Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila, Zamora, 10 ejemplares el 4 de enero de 2011, 13 aves entre el 7 de enero y el 12 de febrero, y cuatro individuos los días 20 y 21 de febrero (J. M. San Román, D. González, P. Decimavilla, J. J. Orduña y otros). En la laguna de La Nava, Palencia, un grupo de 25 ejemplares entre el 12 de febrero y el 14 de marzo de 2011 (E. Carballal, J. R. Vaquero y otros). Se cuentan 13 aves en la laguna de Pedraza, Palencia, el 29 de enero de 2011 (J. A. García). Seis individuos en Torremormojón, Palencia, el 29 de enero de 2011 (F. Jubete y L. Lobo). Dos aves en la laguna Herrera, Aldealafuente, Soria, el 6 de marzo de 2011 (J. Ruiz). Seis ejemplares en Vila-Seca, Tarragona, los días 17 y 22 de enero de 2011 (A. Cama y C. Albert). Un ave en el embalse de Valdecañas, Cáceres, los días 8 (J. Briz y V. Risco) y 11 de diciembre de 2010 (Á. Sánchez). Dos ejemplares en Moheda Alta, Navavillar de Pela, Badajoz, el 19 de diciembre de 2010 (Á. Díaz Pastor). Grupo de siete aves en el embalse de Alarcón, Olivares del Júcar y La Almarcha, Cuenca, desde finales de diciembre hasta el 19 de enero de 2011 (X. Martín). Dos aves en el embalse de Castrejón, Toledo, el 27 de diciembre de 2010 (A. Nicolau y J. Nicolau). Seis individuos en el embalse de To-



Barnacla cariblanca *Branta leucopsis*. Balsa de Suzana (Burgos). Foto: David Martínez Andrade.

re de Abraham, Ciudad Real, el 29 de enero de 2011 (X. Piñero). Primera cita para la provincia de Albacete: dos aves adultas el 24 de junio de 2008 en la laguna de Casa Villora, Chinchilla (J. M. Reolid y D. Cañizares) y se vuelven a ver de nuevo el día 25 en la zona (J. A. Cañizares). Dos aves en Doñana, Huelva, el 26 de diciembre de 2010 (J. L. Anguita). Tres ejemplares en Málaga, Málaga, los días 11, 12 y 21 de febrero de 2011 (A. Tamayo).

BARNACLA CARINEGRA

Branta bernicla

Un individuo en Sancti Petri, Cádiz, el 12 de diciembre de 2010 (A. Savijn y J. L. Anguita). En Cantabria: uno en la bahía de Santander, Cantabria, el 13 de noviembre de 2010 (A. García Herrera); un ejemplar en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el 27 de diciembre de 2010 (C. Gutiérrez) y un ave en el embalse del Ebro, el 21 de enero de 2011 (R. García Obregón) y los días 19 y 20 de marzo de 2011 (J. Tantull, R. Solé y A. Comas). Dos ejemplares en Torremormojón, Palencia, el 29 de enero de 2011 (L. Lobo). Un individuo en el delta del Llobregat, Barcelona, el 21 de enero de 2011 (M. Vall-Llosera).

GANSO DEL NILO

Alopochen aegyptiacus

Una pareja con 9 pollos en el embalse de Ibaheerando, Cáceres, el 5 de octubre de 2010 (G. Sánchez Peña).

TARRO CANELO

Tadorna ferruginea

Concentración destacada de 41 ejemplares en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, Madrid, el 8 de diciembre de 2010 (Á. Álvarez-Escarpizo y M. L. Gómez Gómez). Un individuo sobrevolando el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el 26 de enero de 2011 (M. Díaz Esteban). **Canarias.** En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tías el 29 de octubre de 2010 (A. Unquiles Cobos). En Gran Canaria, en la charca de Masपालomas, San Bartolomé de Tirajana, un ejemplar el

13 de septiembre de 2010 (C. Gutiérrez Expósito), y de nuevo el 17 de octubre de 2010 (R. Barone y R. Otto), así como dos aves el 7 de enero de 2011 (N. Herrera y B. González).

TARRO BLANCO

Tadorna tadorna

Un grupo 10 aves posadas en el agua frente a la playa de la Torre Benagalbón, Rincón de la Victoria, Málaga, el 21 de diciembre de 2010 (S. García Barcelona). Observaciones en Extremadura: la mayor concentración se registró en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, con 28 aves el 29 de enero de 2011 y continúan 23 ejemplares el 12 de febrero de 2011 (M. Kelsey, G. Schreur, L. Lozano y J. Solana).

PATO MANDARÍN

Aix galericulata

Un macho junto a cinco machos de ánade azulón en el embalse de Castro, Zamora, el 4 de abril de 2011 (S. Peris).

ÁNADE FRISO

Anas strepera

Canarias. Inusual arribada de efectivos en fechas invernales. En Fuerteventura, en una charca del campo de golf de Caleta de Fustes, Antigua, cuatro aves el 23 de diciembre de 2010 (M. Cabrera). En Tenerife, en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, una hembra entre los días 22 de enero y 6 de febrero de 2011 (D. Trujillo). Un macho en un estanque de La Barranquera, Valle de Guerra, La Laguna, los días 5 y 11 de diciembre de 2010 (R. Barone y B. Fariña). Una hembra en la charca de Bernardino, Granadilla de Abona, y dos machos adultos en la charca del Fraile, Arona, en ambos casos el 6 de diciembre de 2010 (R. Barone, M. Fernández Del Castillo, J. Vizcaíno, V. R. Cerdeña, J.-G. Le Roux y R. Jorge), aunque las dos aves son vistas previamente, el 23 de noviembre de 2010, y una de ellas sigue allí el 13 de enero y el 12 de marzo de 2011 (A. Hernández) y al menos hasta el 16 de marzo de 2011 (J.-G. Le Roux, M. Chevalier y G. Monnier). Un ejemplar en Cigüaña, Granadilla de Abona, el 13 de enero y el 12 de

marzo de 2011 (A. Hernández). En La Palma, un juvenil en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, los días 20, 30 y 31 de octubre de 2010, y todo el mes de noviembre de 2010, aunque en diciembre de 2010 hay otro individuo distinto y a partir del día 12 se le suman otras cuatro aves, permaneciendo allí los cinco ejemplares dicho mes, así como en enero, febrero y hasta el 10 de marzo de 2011, puesto que el 16 de marzo de 2011 sólo queda un individuo (R. Burton).

ÁNADE AZULÓN

Anas platyrhynchos

Alrededor de 600 aves alimentándose en rastros de la campiña de Olivares, Sevilla, el 12 de agosto de 2010 (A. Domínguez).

CERCETA COMÚN

Anas crecca

Canarias. En Lanzarote, en Janubio, Yaiza, grupo de 18 aves el 3 de enero de 2011 (J. Sagardía), aumentando a 23 aves el 18 de enero de 2011 (F. J. García Vargas). En Tenerife, en Granadilla de Abona, grupo de 11 aves en charca de riego en Cigüaña el 12 de marzo de 2011, y otro de 17 ejemplares en Bernardino los días 13 de enero y 12 de marzo de 2011 (A. Hernández). En La Palma, en charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, entre 4 y 12 aves en noviembre, de 4 a 16 aves en diciembre de 2010 y un grupo de 30 individuos en la misma charca el 4 de enero de 2011, si bien el 22 de enero se reparten en sendas charcas en dos grupos de 14 y 15 aves respectivamente, disminuyendo a 6-16 aves en febrero, y a 11-13 aves hasta el 7 de marzo de 2011 (R. Burton).

ÁNADE RABUDO

Anas acuta

Canarias. En Fuerteventura, en charca del campo de golf de Caleta de Fustes, Antigua, dos aves el 23 de diciembre de 2010 (M. Cabrera). En La Palma, en charca de riego de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, uno del 18 al 31 de diciembre de 2010, así como durante todo el mes de enero y febrero y al menos hasta el 10 de marzo de 2011 cuando deja de detectarse (R. Burton).

CERCETA CARRETONA

Anas querquedula

Canarias. En Tenerife, una en charca de riego en Cigüaña, Granadilla de Abona, el 23 de octubre de 2010, y otra en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife el 17 de noviembre de 2010 (A. Hernández). En La Palma, un juvenil en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2010 (R. Burton).

CUCHARA COMÚN

Anas clypeata

Canarias. En Lanzarote, un macho en el campo de golf de Tías el 1 de marzo de 2011 (D. Pérez y F. J. García Vargas), permaneciendo allí los días 2 de marzo (F. J. García Vargas) y 3 de marzo de 2011 (A. Unquiles Cobos). En La Palma, en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un macho del 25 de noviembre de 2010 al 20 de febrero de 2011, y una hembra o juvenil en una charca de La Costa, Tazacorte, del 3 al 12 de febrero de 2011 (R. Burton).

CERCETA PARDILLA

Marmaronetta angustirostris

Hasta 34 ejemplares en Trebujena, Cádiz, el 21 de enero de 2011 (J. J. Díaz Díaz). Dos ejemplares en el embalse de La Almendra, Salamanca, el 9 de enero de 2011 (J. J. Ramos Encalado). Dos individuos en la Encañizada, delta del Ebro, Tarragona, entre el 23 de enero y el 1 de febrero de 2011 (M. Casas y S. Christopher).

PATO COLORADO

Netta rufina

Un grupo de 10 machos y 12 hembras en la balsa de Fontecha, Fontecha del Páramo, León, el 23 de octubre de 2010 (D. Miguélez).

PORRÓN PARDO

Aythya nyroca

Una hembra en El Portil, Huelva, el 23 de marzo de 2010 (J. A. Lama y F. Chiclana). Un aparente híbrido con porrón común en la laguna del Acebuche, Doñana, Huelva, el 21 de febrero de 2011 (Á.

Díaz Pastor). Una hembra en la Corta de los Olivillos, Puebla del Río, Sevilla, el 3 de diciembre de 2010 y cinco machos el 29 de diciembre (F. Chiclana). Ocho ejemplares en Puebla del Río, Sevilla, el 1 de enero de 2011 (J. L. Anguita y A. Savijn). Dos aves en Aznalcázar, Sevilla, el 29 de marzo de 2011 (J. A. Sarrión). Tres ejemplares en la laguna Dulce de Campillos, Málaga, el 18 de noviembre de 2010 (A. M. Pérez, G. Lage, P. Pérez y otros) y una pareja el 11 de febrero de 2011 (A. M. Pérez). Un macho en Vilagudín, A Coruña, el 26 de diciembre de 2010 (A. del Río y M. J. Regueiro). Un macho en el embalse de Alcarrás, Lleida, el 8 de enero de 2011 (A. Sebe, A. Mendoza, J. Moreno y C. Peligero). Un macho en la Balsa de Lor, Cascañe, Navarra, el 15 de enero de 2011 (J. Ardaiz y L. Goñi). Un macho en el azud de Sahechores, Sahechores de la Rueda, León, el 31 de octubre de 2010 (H. Astiárraga y S. de Elera). Un individuo en la laguna de Meco, Madrid, el 11 de abril de 2011 (J. L. Aguirre, C. Talabante, A. Aparicio, G. Díaz y A. Larrán/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

PORRÓN MOÑUDO

Aythya fuligula

Canarias. En Tenerife, una hembra en la charca del Fraile, Arona, el 6 de diciembre de 2010 (V. R. Cerdeña, J.-G. Le Roux, R. Barone, J. Vizcaíno, M. Fernández del Castillo y R. Jorge), aunque antes, el 23 de noviembre de 2010, se citan allí mismo dos aves, y posteriormente un grupo de cinco ejemplares el 12 de marzo de 2011 (A. Hernández) y de nuevo el 16 de marzo de 2011 (J.-G. Le Roux, M. Chevalier y G. Monnier). Además, uno en la charca de Bernardino, Granadilla de Abona, el 23 de noviembre de 2010 (A. Hernández). En La Palma, en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, hay cinco machos y una hembra el 25 de noviembre de 2010, pero sólo quedan 2-3 aves a partir del 27 de dicho mes, y en diciembre se quedan allí tres de las seis aves del principio, al menos hasta el 14 de febrero de 2011 (R. Burton).

PORRÓN BASTARDO

Aythya marila

Una hembra en la balsa de Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 28 de marzo de

2010 (D. Miguélez). Una hembra en Villaviciosa, Asturias, los días 9, 10 y 11 de octubre de 2010 (A. Villaverde). Una hembra en La Lantejuela, Sevilla, el 12 de diciembre de 2010 (M. Villaécija). Un macho de segundo año en Vila Seca, Tarragona, el 5 de enero de 2011 (C. Albert y A. Cama). Una hembra en Nigrán, Pontevedra, el 7 de enero de 2011 (E. Carballal). Un macho en la ría de Treto, Santoña, Cantabria, el 27 de diciembre de 2010 (C. Gutiérrez). Un macho de primer invierno en la marisma Blanca, Santander, Cantabria, el 10 de enero de 2011 y el día 14 es observado en Alday, Camargo, Cantabria (A. Ruiz Elejalde).

PATO HAVELDA

Clangula hyemalis

En A Coruña, una hembra en El Ferrol, el 29 de enero de 2011 (A. Salazar) y un ejemplar en la laguna de Doniños, el 19 de febrero de 2011 (D. Calleja).

PORRÓN OSCULADO

Bucephala clangula

Cita de interior y tardía: una hembra en la balsa de Santa Cristina, Cristina del Páramo, León, el 15 de mayo de 2010, presumiblemente el mismo ejemplar es observado una semana después, el 23 de mayo en la Balsa Fontecha, en la localidad de Fontecha del Páramo (D. Miguélez).

SERRETA MEDIANA

Mergus serrator

Un ejemplar frente a Montehano en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Cantabria, el 15 de enero de 2011 (D. Martínez Andrade y G. Ruiz del Río).

MALVASÍA CANELA

Oxyura jamaicensis

Un individuo en Villaviciosa, Asturias, los días 9 y 10 de octubre de 2010 (X. Cortés, J. Salazar y N. Castela). Un ave en El Hondo, Alicante, el 21 de enero de 2011 (J. L. Echevarría).

MALVASÍA CABECIBLANCA*Oxyura leucocephala*

Hasta 57 aves en la laguna de Ontalafia, Albacete, el 1 de febrero de 2011 (R. Torralba). Unos mil ejemplares en la Cañada de las Norias, Almería, en el invierno 2010/2011 (R. Martín). Se cuentan 200 ejemplares en la laguna Dulce de Campillos, Málaga, el 18 de noviembre de 2010 (A. M. Pérez, G. Lage, P. Pérez y otros) y 80 aves el 2 de diciembre (J. A. Sencianes).

PERDIZ ROJA*Alectoris rufa*

Canarias. Dato de nidificación en Gran Canaria: el 30 de abril de 2010 en un pinar de repoblación de pino canario (*Pinus canariensis*) y pino de Monterrey (*P. radiata*) de la zona alta de La Culata, Tejeda, se halla un nido con 11 huevos ubicado entre acículas y ramas muertas de pino (D. Trujillo).

PINTADA COMÚN*Numida meleagris*

Canarias. En Tenerife, el 27 de junio de 2008 cerca del Colegio de La Vera, Icod de los Vinos, se detectan dos aves (D. Trujillo).

COLIMBO GRANDE*Gavia immer*

Un ejemplar en Torremolinos, Málaga, el 23 de noviembre de 2010 (B. López). Un adulto en la bahía de Cádiz, Cádiz, el 20 de diciembre de 2010 (R. García). Un individuo en el embalse del Ebro, Cantabria, el 28 de diciembre de 2010 (M. Alonso).

SOMORMUJO CUELLIROJO*Podiceps grisegena*

Un ejemplar de primer invierno en la bahía de Txingudi, Irún, Guipúzcoa, el 20 de noviembre de 2010 (D. Martínez Andrade). Uno en Fuenterrabía, Guipúzcoa, el 18 de marzo de 2011 (R. Rodríguez). Uno en la albufera de Valencia, el 7 de febrero de 2011 (J. Ruiz).

ZAMPULLÍN CUELLIRROJO*Podiceps auritus*

En A Coruña: un ave en El Ferrol, el 20 de enero de 2011 (D. Martínez Lago) y el 10 de febrero de 2011 (M. A. Fernández), y se llegan a contar hasta cinco en Cariño, dos aves desde el 3 de diciembre de 2010 al 18 de enero de 2011, cuatro el día 19 de enero, cinco entre el 30 de enero y el 27 de febrero, y dos ejemplares el 6 de marzo (M. Otero, D. Calleja, R. Hevia, P. Gutiérrez, X. Prieto y otros). En Asturias, un individuo en Gijón, el 19 de enero de 2011 (E. García Sánchez) y dos aves en Lluanco, Gozón, el 16 de enero de 2011 (X. Cortés y M. Fernández). En Santoña, Cantabria: un ejemplar el 4 y el 18 de noviembre; cinco ejemplares desde el 25 de diciembre de 2010, que aumentan a siete a partir del 4 de enero de 2011; se cuentan ocho el día 10 de febrero; última observación de cinco aves el 11 de febrero (A. García Herrera). Tres individuos en Camargo, Cantabria, el 14 de enero de 2011 (A. Rodrigo y M. Alonso). Un ejemplar en el delta del Llobregat, Barcelona, el 20 de diciembre de 2010 (F. López, C. Fernández y E. Bonastre). En el delta del Ebro, Tarragona, presencia entre el 18 de diciembre de 2010 y el 26 de febrero de 2011, con un máximo de cinco aves el 19 de febrero (J. Tantull, P. Bescós, P. Feliú y otros).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO*Podiceps nigricollis*

Canarias. En Lanzarote, de nuevo invernada en Janubio, Yaiza, contándose dos aves el 9 de septiembre de 2010 (F. J. García Vargas, A. Unquiles Cobos y J. Sagardía) y entre el 4 y el 20 de octubre de 2010 (F. J. García Vargas), así como cuatro ejemplares del 23 de noviembre de 2010 al 14 de diciembre de 2010, pero aumentando a siete ejemplares el 28 de diciembre de 2010 y aún allí los siete el 18 de enero de 2011 (F. J. García Vargas). En Tenerife, en la balsa de La Tabona, La Guancha, se constata la presencia de individuos solitarios el 7 de diciembre de 2000, entre el 15 y 16 de noviembre de 2001, y por último el 3 de diciembre de 2002 (D. Trujillo).

PARDELA CENICIENTA
Calonectris diomedea

Un ejemplar juvenil orillado en la playa de la Torre del Jaral, Málaga, el 6 de noviembre de 2010; por el aspecto que presentaba llevaba del orden de 15 días orillada (J. González-Solís y S. García Barcelona).

PARDELA SOMBRÍA
Puffinus griseus

Un ejemplar en el cabo de Creus, Girona, el 6 de octubre de 2010 (M. A. Fuentes y G. Dalmau).

Canarias. Dos aves en aguas al norte de Lanzarote el 19 de septiembre de 2010 (J. Sagardía y A. Unquiles Cobos).

PARDELA PICHONETA
Puffinus puffinus

Canarias. Datos en localidad de probable nidificación en Tenerife. El 4 de abril de 2008 se escuchan dos aves ligadas al barranco Garabato y un individuo, con el mismo comportamiento, en La Tarasca, ambos enclaves ubicados en la Ladera de Tiguaiga, Los Realejos. En los últimos años la especie ha experimentado un decremento importante en Canarias, constatándose la desaparición de varias colonias de cría de repisas concretas de La Palma y en Tenerife (D. Trujillo).

PAÍÑO PECHIALBO
Pelagodroma marina

Canarias. Tras fuerte temporal de lluvia y vientos, se recogen aves accidentadas en varias islas. En Tenerife, al menos tres ejemplares que pueden recuperarse y liberarse por el personal del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo de Tenerife: uno capturado en Las Américas, Adeje, el 25 de enero de 2011 (C. Méndez), y los dos restantes en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, uno encontrado en la Plaza de Candelaria el 4 de febrero de 2011 y el otro recogido en la Plaza de Weyler el 5 de febrero de 2011 (A. Hernández). En La Gomera, uno recogido en el paseo marítimo de Playa Santiago, Alajeró, el 28 de enero de 2011, liberándose



Paíño pechialbo *Pelagodroma marina*. Alajeró (La Gomera). Foto: Juana María Darias.

se al poco tiempo de ser recuperado por el personal de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera (J. M. Darias).

PAÍÑO BOREAL
Oceanodroma leucorhoa

Especie que aparece en el litoral gaditano coincidiendo con temporales: 10 ejemplares en la playa de La Caleta, Cádiz, el 12 y 31 de diciembre de 2009 con temporal y vientos del suroeste-oeste (M. Jiménez Cintado). Dos aves en Punta la Vaca, Gozón, Asturias, el 10 de noviembre de 2010 (C. Álvarez Usategui, M. Pajuelo, D. López, Velasco, N. Castelao, M. García Gala y X. Cortés). Dos ejemplares en cabo Mayor, Santander, Cantabria, los días 1 y 11 de noviembre de 2010 (A. García Herrera).

ALCATRAZ ATLÁNTICO
Morus bassanus

Canarias. En Lanzarote, en aguas frente a Arrecife, detección regular de efectivos: dos el 18 de diciembre de 2010, uno el 28 de enero de 2010, y cuatro el 26 de marzo de 2011 (F. J. García Vargas). En Tenerife, en aguas frente a Puerto Santiago, Santiago del Teide, un grupo de 10 ejemplares adultos en vuelo el 21 de febrero de 2011 y dos adultos el 22 de febrero de 2011 (S. Cherrug).

CORMORÁN GRANDE*Phalacrocorax carbo*

Dormidero con unos 1.500 ejemplares en el embalse de Cubilar, Logrosán, Cáceres, el 15 de enero de 2011 (J. M. Traverso).

Canarias. En Tenerife, en el muelle de Las Gaviotas, San Miguel, un ejemplar el 29 de octubre de 2010 (V. Cardoso y G. Peña).

AVETORO COMÚN*Botaurus stellaris*

Uno en el Soto de las Juntas, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, el 11 de octubre de 2010 (P. Martín). Un ejemplar en el Galacho de Juslibol, Zaragoza, el 17 de diciembre de 2010 (R. Pérez). Un individuo en el embalse de Arrocampo, Cáceres, los días 8 de enero (S. Mayordomo) y 27 de febrero de 2011 (G. Schreur y M. Kelsey). Un ejemplar en la laguna de Doniños, A Coruña, el 19 de febrero de 2011 (D. Calleja).

MARTINETE COMÚN*Nycticorax nycticorax*

Canarias. En Tenerife, un ejemplar juvenil en uno de los estanques de Tejina-Valle de Guerra, La Laguna, el 5 de diciembre de 2010; el mismo día, un total de 7 individuos (4 adultos, 2 inmaduros y otro probable adulto) sale al atardecer de una de las charcas terrosas de dicha localidad (R. Barone y B. Fariña). Previamente, el 12 de noviembre de 2010, en esta localidad se cuentan cinco aves (R. Larsson).

GARCILLA CANGREJERA*Ardeola ralloides*

Un individuo en Laguna Fuente, León, el 27 de agosto de 2010 (T. Sanz y J. M. San Román). Un ejemplar joven en la laguna de Meco, Madrid, el día 18 de agosto de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH). Un ejemplar en arrozales de Campo Lugar, Cáceres, el 14 de noviembre de 2010 (M. Kelsey) y de nuevo el 23 de enero de 2011 (SEO-Cáceres). Un ejemplar en el Vado de Don Simón, Puebla del Río, Sevilla, el 24 de diciembre de 2010 (A. Domínguez).

Canarias. Primera cita para El Hierro: un ejemplar inmaduro en el embalse de Frontera el 8 de marzo de 2011 (D. García).

GARCILLA BUEYERA*Bubulcus ibis*

Canarias. En Tenerife, cinco ejemplares en una charca junto a un campo de golf en San Miguel de Abona el 10 de octubre de 2010 (M. Fernández del Castillo, V. R. Cerdeña y R. Barone), y grupo de 12 individuos junto a una granja de gallinas de la zona de Tejina-Valle de Guerra, La Laguna, el 5 de diciembre de 2010 (R. Barone y B. Fariña). Previamente, el 12 de noviembre de 2010, cerca de esta localidad, en charcas de riego de Tejina y Bajamar, La Laguna, se cuentan hasta 20 individuos (R. Larsson), así como un mínimo de nueve ejemplares el 26 de octubre de 2010 (J. A. Lorenzo). En La Palma, en una zona de charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, dos ejemplares del 13 al 25 de septiembre y un ejemplar los días 3 y 8 de octubre de 2010, así como un ejemplar en el borde de la Carretera Norte, salida de Santa Cruz, el día 8 de diciembre de 2010, unas 6 aves descansando en dos charcas colindantes en Cabrejas, Tazacorte, el día 2 de noviembre de 2010, y una en un dormidero de garceta común el 19 de enero de 2011 en Los Cardonales, Tazacorte (R. Burton).

GARCETA COMÚN*Egretta garzetta*

Confirmación de cría en Galicia en la temporada de cría de 2009. En un islote de la Ensenada de O Grove (Pontevedra) se estableció una pequeña colonia (< 10 parejas) de garceta común. A finales del mes de agosto se observaron 9 pollos ya casi independientes moviéndose por el islote. En la temporada de cría de 2010, en el mismo islote se establecieron al menos 8 parejas que abandonaron la colonia a principios del mes de julio, para trasladarse a otro islote de la ensenada donde intentaron criar hasta la tercera semana de julio, para finalmente abandonar y no tener éxito. Se trata de la primera confirmación de cría documentada en Galicia para la especie, después de algún intento esporádico en el sur de la provincia de

Pontevedra (Baixo Miño) y de vagas referencias en la provincia de Ourense en Antela (M. Lorenzo). **Canarias.** En La Palma, avistamiento de 19 ejemplares en acantilados marinos cercanos al puerto de Tzacorte el 27 de mayo de 2004 (D. García y P. Arbona).

GARCETA GRANDE

Egretta alba

Hasta 30 aves en la albufera de Valencia el 22 de diciembre de 2010 (J. Puentes y V. Esteller). Se avistan 17 ejemplares en Txingudi, Irún, Guipúzcoa, el 5 de noviembre de 2010 (Itsas Enara). Se observan 15 aves en Charco Salado, Casatejada, Cáceres, el 2 de octubre de 2010 (S. Mayordomo). Se cuentan 18 ejemplares en Toril y Malpartida de Plasencia, Cáceres, el 27 de enero de 2011; 15 de ellos entrando a un dormidero en el río Tiétar (J. Prieta).

GARZA IMPERIAL

Ardea purpurea

Registro invernal: un juvenil en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 30 de diciembre de 2010 (A. Tamayo). Posible cría de garza imperial en Burgos: dos adultos entrando y saliendo a una zona de carrizal de la lagunita Bayas, Miranda de Ebro, Burgos, el 23 de junio de 2010 (L. Lobo). **Canarias.** En Lanzarote, un ejemplar en las salinas de Janubio, Yaiza, el 25 de abril de 2000 (D. Trujillo).

CIGÜENA NEGRA

Ciconia nigra

Un ave atropellada en la carretera comarcal C-626, km 33,8, Robledo de Babia, León, el 18 de mayo de 2010 (D. Miguélez). Un individuo en Cartagena, Murcia, el 9 de octubre de 2010 (R. Howard). Recuento de 33 ejemplares en el embalse de Orellana, Badajoz, el 24 de octubre de 2010 (Á. Sánchez). Un ave en los campos de cultivos de Torres de Val, cerca del río Ebro, Zaragoza, entre un grupo de 190 cigüeñas blancas, el 7 de diciembre de 2010 (F. Pardo y U. Pardo). Cuatro aves en las marismas de las Mesas, Jerez de la Frontera, Cádiz, el 4 de diciembre de 2010 (A. Domínguez).

CIGÜENA COMÚN

Ciconia ciconia

Canarias. En La Palma, el 7 de junio de 2008 en Don Pedro, Garafía, se halla el cadáver de un ejemplar, aparentemente adulto, el cual lleva muerto algún tiempo (D. Trujillo y V. García). Podría corresponder con el mismo ejemplar muerto documentado en esa localidad en abril de dicho año (véase *Ardeola*, 55: 293).

IBIS SAGRADO

Threskiornis aethiopicus

Un ave junto a un grupo de garcetas comunes y un morito común en las marismas de Bengoa en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Cantabria, el 15 de enero de 2011 (D. Martínez Andrade y G. Ruiz del Río).

MORITO COMÚN

Plegadis falcinellus

Dos mil ejemplares en arrozales del Brazo del Este, Sevilla, el 24 de octubre de 2010 (J. L. Anguita). Un ave junto a un grupo de garcetas comunes y un ibis sagrado en las marismas de Bengoa en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, Cantabria, el 15 de enero de 2011 (D. Martínez Andrade y G. Ruiz del Río).

Canarias. En La Palma, un individuo en una charca de riego de Cabrejas, Tzacorte, del 12 al 29 de septiembre de 2010 y en charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, entre el 2 y el 19 de octubre de 2010 (R. Burton).

ESPÁTULA COMÚN

Platalea leucorodia

Se censan 15 parejas nidificantes en la colonia de Candeleda, Ávila, en la primavera de 2010 (M. Hernández). Grupo de 19 aves en Los Arenales, Cáceres, el 9 de enero de 2011 (F. J. Caballero). Hasta nueve ejemplares en el humedal estacional en Meco (Madrid), el día 7 de mayo 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

Canarias. En Lanzarote, en octubre de 2010: una en Puerto del Carmen, Tías, el día 15 (F. J. García

Vargas), un grupo de nueve aves en vuelo sobre dicha localidad el día 17 (F. J. García Vargas) y ese mismo día en Órzola, Haría, tres ejemplares (F. J. García Vargas y J. Sagardía), dos aves en La Santa, Tinajo, el día 19 (J. Sagardía), un grupo de 10 aves en Puerto del Carmen, Tías, el 21 de octubre de 2010, así como un ejemplar en Arrecife el día 27 (F. J. García Vargas). En Tenerife, observaciones en localidades del noreste: en una de las charcas terrosas de Tejina, La Laguna, un juvenil el 26 de octubre de 2010 (J. A. Lorenzo), el 25 de noviembre de 2010 (R. Larsson) y de nuevo allí el 5 de diciembre de 2010, y con posterioridad, el 2 de febrero de 2011, se observan dos aves inmaduras en vuelo sobre el barranco del Espinal en Tejina y Valle de Guerra, La Laguna (R. Barone, B. Fariña, A. Arbelo y M. J. Pérez).

FLAMENCO COMÚN

Phoenicopterus roseus

Se avistan 11 ejemplares en La Albuera, Badajoz, el 9 de febrero de 2011 (J. M. Álvarez).

MILANO REAL

Milvus milvus

En Málaga, donde es una especie rara como invernante (Cardiel, 2006): un ave en los alrededores de la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 28 de diciembre de 2010 (F. J. Molina, A. García y J. M. González).

QUEBRANTAHUESOS

Gypaetus barbatus

Un adulto en Hornillalastra, Burgos, el 7 de enero de 2011 (R. Pereda). Un subadulto en el puerto de Montenegro, entre Viniegra de Arriba, La Rioja, y Montenegro de Cameros, Soria, el 16 de abril de 2011 (J. Serradilla).

ALIMOCHÉ COMÚN

Neophron percnopterus

Dormidero habitual en el centro de la provincia de Cáceres (localidad confidencial): dos adultos y un joven el 1 de noviembre de 2010 (E. Palacios y M. A. Muñoz); máximo de 16 ejemplares a prin-

cipios de enero de 2011 (A. Rodríguez). Tres adultos en los Canchos de Ramiro, Cáceres, el 26 de diciembre de 2010 (C. Clemente). Un adulto en La Roca de la Sierra, Badajoz, el 15 de diciembre de 2010 (Á. L. Sánchez).

BUITRE NEGRO

Aegypius monachus

Se observa un individuo junto a varios buitres leonados que acaba posándose en el suelo, próximo a un nevero, donde se encuentra otro ejemplar de buitre negro, en la sierra del Páramo, Somiedo, Asturias, el 19 de mayo de 2010 (D. Díaz Díaz y E. Alcalá). Dos días más tarde al atardecer, se vuelve a ver un ave posada junto a dos buitres leonados en un paraje próximo (D. Díaz Díaz y S. Palacios).

CULEBRERA EUROPEA

Circaetus gallicus

Unas 20 aves acuden a un posible dormidero en Nerpio, Albacete, a principios de octubre de 2010 (S. O. Pinedo). Un individuo en La Carlota, Córdoba, el 4 de diciembre de 2010 (F. J. Díaz). Uno en el pinar de La Algaida, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 24 de diciembre de 2010 (J. J. Díaz Díaz). Primer registro en diciembre en Extremadura: un ave cerca de El Gordo, en el límite entre Cáceres y Toledo, el 7 de diciembre de 2010 (J. Briz).

AGUILUCHO CENIZO

Circus pygargus

Primer registro invernal en Extremadura: un ave en Navas del Madroño, Cáceres, el 29 de diciembre de 2010 (A. Ceballos).

Canarias. En el islote de Alegranza, Teguieste, en el sector de La Rapadura, un ejemplar de fase oscura es acosado por varios individuos de halcón de Eleonora el 15 de octubre de 2002 (D. Trujillo).

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

Aquila adalberti

Un juvenil en Porto do Son, A Coruña, a mediados de octubre de 2010 (C. Sánchez).

AGUILILLA CALZADA*Hieraetus pennatus*

Canarias. Más observaciones que reflejan su presencia regular en el archipiélago en los últimos años. En Fuerteventura, en Antigua, una sobrevolando el campo de golf de Caleta de Fustes el 11 de septiembre de 2010 (D. Pérez), y cerca de Pozo Negro otra el 5 de enero de 2011 (R. Cerdeña). En Tenerife, el 7 de febrero de 2007 cerca de barranco Hondo, La Victoria, se observa un ejemplar de fase clara y otro individuo cuya fase no pudo determinarse, y el 7 de marzo de 2008 en Armeñime, Adeje, un ave de fase clara (D. Trujillo). En la Montaña de Taco en Buenavista del Norte, una el 16 de noviembre de 2010 (N. Pérez). En El Hierro, el 28 de septiembre de 2010 cerca de la montaña de la Casilla, El Pinar, se avistan hasta cuatro individuos, aunque las aves llevan en el lugar varios días (S. Padrón y otros; comunicado por D. Trujillo y M. A. Rodríguez).

ÁGUILA PESCADORA*Pandion haliaetus*

Canarias. En Gran Canaria, citas primaverales y estivales: en el embalse de Cuevas de las Niñas, Tejeda, un ave el 7 de mayo de 2008; en el mismo lugar se observa un adulto transportando un pez el 3 de mayo de 2010, y finalmente el 17 de julio de ese último año se avista un individuo. En la presa de Chira, Cercados de Araña, San Bartolomé de Tirajana, el 25 de mayo de 2010 se observa un adulto posado en una torreta de conducción eléctrica, y el 6 de julio de ese año, en la misma torreta, un ave adulta, quizás la misma que se avistó en mayo (D. Trujillo y V. Suárez). En La Palma, complementando la información anterior (véase *Ardeola*, 57: 526-527), un ejemplar posado y luego en vuelo por la ladera sur de la montaña de la Laguna, Tazacorte, el 30 de noviembre de 2010.

CERNÍCALO VULGAR*Falco tinnunculus*

Canarias. En Tenerife, nidificación en pino canario: en las proximidades de La Fortaleza, San Juan de La Rambla, a 2.070 m de altitud, el 14 de

junio de 2005 se halla un nido con cuatro pollos completamente emplumados en un pino canario (*Pinus canariensis*) de tan solo 7 u 8 m de altura. El nido se ubica sobre cúmulos de acículas en una rama, a poco más de 4 m del suelo (D. Trujillo).

CERNÍCALO PATIRROJO*Falco vespertinus*

Dos ejemplares en La Janda, Cádiz, el 25 de marzo de 2011 (A. Broniarek). Una hembra adulta en el desierto de Las Palmas, Castellón, el 14 de octubre de 2010 (M. Tirado).

ALCOTÁN EUROPEO*Falco subbuteo*

Se avista un ejemplar en fecha tardía: un adulto en Málaga, el 25 de noviembre de 2010 (A. Paterson).

HALCÓN DE ELEONORA*Falco eleonora*

Primeras citas para la provincia de Albacete: un individuo de fase clara en los alrededores de El Monte, el 3 de junio de 2007 (V. M. Piqueras y D. Cañizares) y uno de fase oscura en los alrededores de La Lobera, el 7 de junio de 2009 (D. Cañizares). Un ave en Gualchos, Granada, el 16 de junio de 2010 (J. Díez Castro).

Canarias. En Gran Canaria: el 7 de julio de 2006 en Alsándara y Yescas, en la Reserva Natural Integral de Inagua, Ojeda y Pajonales se observa un ejemplar de fase oscura; el 15 de mayo de 2007 cerca del primer enclave citado se detecta un ave de fase clara; el 16 de mayo de 2008 en el llano de Juan Martín, en el límite del espacio natural mencionado, se observa un individuo de fase intermedia cazando langosta marroquí (*Doclostaurus maroccanus*); el 20 de junio de 2008 cerca de Aríñez, Vega de San Mateo, se detecta un ejemplar; el 7 de junio de 2009 en Ñameritas, en la reserva ya citada, se avista un ave de fase clara; el 14 de julio de 2009 en la presa de Los Hornos, Tejeda, se detecta un individuo de la misma fase que el ave anterior; el 13 de junio de 2010 en Cercados de Araña, San Bartolomé de Tirajana, otro ejemplar también de fase clara, y los días 24 de julio

de 2009 y el 18 de julio de 2010 entre Ariñez, Vega de San Mateo, y Cueva Corcho, Valleseco, se avistan, respectivamente, dos aves de fase clara y cuatro individuos –fase clara, intermedia, oscura e indeterminada– cazando (D. Trujillo). Estos datos complementan las citas de la isla de julio de 2007 y 2009, respectivamente (véase *Ardeola*, 54: 395 y *Ardeola*, 56: 353). En Tenerife, el 7 de julio de 2008 en San Juan del Reparo, Garachico, se observa un ejemplar de fase clara (D. Trujillo).

POLLUELA PINTOJA

Porzana porzana

Un ave en la laguna de Meco, Madrid, el 5 de abril de 2011 (J. L. Aguirre, C. Talabante, A. Aparicio, G. Díaz y A. Larrán/Cátedra de Medio Ambiente, UAH). Una en Plaiaundi, marismas de Txingudi, Irún, Guipúzcoa, el 8 de abril de 2011 (Ó. Carazo).

Canarias. En Lanzarote, un ejemplar en el campo de golf de Tías el 14 de octubre de 2010 (J. Rodríguez Martínez), y posteriormente el día 16 (J. Sagardía) y el 17 (F. J. García Vargas y J. Sagardía); de nuevo allí el 22 de octubre de 2010 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos), los días 16 y 28 de noviembre de 2010 y por última vez el 2 de diciembre de 2010 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, una en Catalina García, Tuineje, el 26 de marzo de 2011 (C. M. Martín).

POLLUELA BASTARDA

Porzana parva

Un macho en el humedal El Cerro de las Cigüeñas, Los Palacios, Sevilla, entre el 4 y el 20 de marzo de 2011 (J. L. Anguita, A. Savijn, F. Chiclana y otros).

FOCHA COMÚN

Fulica atra

Canarias. En Tenerife, el 19 de agosto de 2010 había 18 ejemplares en la balsa de San Antonio, La Matanza de Acentejo, cifra máxima registrada hasta ahora en ese enclave, donde la especie está presente durante todo el año (R. Barone, A. Arbelo y M. J. Pérez). En esta misma isla, nueva localidad de nidificación: el 10 de marzo de 2011 en



Focha moruna *Fulica cristata*. Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Foto: Javier Hernández.

la charca de los Ascanio, La Orotava, se observan ocho adultos y tres nidos –uno de ellos con cuatro huevos–; en su confección mayoritariamente utilizan plásticos (bolsas, etc.) debido a la escasez de material natural (D. Trujillo y D. García).

FOCHA MORUNA

Fulica cristata

Dos ejemplares en las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 10 de febrero de 2011 (J. M. Ranz) y el 18 de marzo (M. J. Valencia y X. Piñeiro) y uno el 27 de abril de 2011 (J. Hernández). Uno en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 30 de diciembre de 2010 (A. Tamayo). Un ave en la laguna de Ontalafia, Albacete, el 1 de febrero de 2011 (R. Torralba).

OSTRERO EUROASIÁTICO

Haematopus ostralegus

Cita de interior de un ave adulta durante el paso postnupcial en el embalse de La Tabla, Jiménez de Jamuz, León, 14 de septiembre de 2010 (C. Zumalacárregui y F. de la Calzada).

CIGÜEÑUELA COMÚN

Himantopus himantopus

Mayor concentración conocida en Extremadura hasta el momento en periodo invernal: un millar

de aves en arrozales de Santa Amalia, Badajoz, el 30 de diciembre de 2010 (Á. Sánchez).

ALCARAVÁN COMÚN

Burhinus oedicnemus

Canarias. En La Palma, datos de reproducción: el 24 de mayo de 2004, en Tacande, El Paso, en pastizales que se encuentran entre la calle de Juan Morales y Las Eras, se halla un pollo de pequeño tamaño bajo una tabaiba (*Euphorbia lamarckii*); ese mismo día se localiza un nido con dos huevos al lado de esa especie vegetal, en las proximidades de una fábrica de pienso. El 18 de junio de ese año, en este último lugar, se encuentra un pollo de dicha puesta (D. Trujillo). En esta misma isla, en una parcela en el Llano de las Cuevas, El Paso, a partir del día 22 de marzo de 2010 se detectan dos aves adultas, y se sospecha que están criando en el lugar por su comportamiento en distintas visitas efectuadas a partir del día 25 de dicho mes y hasta el 11 de abril. En la siguiente visita, el 15 de abril de 2010, la pareja cuenta con un pollo de pocos días de edad, constatándose su supervivencia al menos hasta el 25 de abril de 2010. Con posterioridad, en una parcela con ganado porcino en el mismo sector se escuchan reclamos de dos adultos el 13 de mayo 2010, y además se observa un adulto en un prado con ganado vacuno cerca de la carretera de La Costa, Tazacorte, el día 23 de mayo 2010 (R. Burton). En La Gomera, en llanos de punta de La Gaviota, San Sebastián, una localidad clásica de presencia de esta especie, el 31 marzo de 2004 se localiza una puesta de dos huevos (D. Trujillo y J. Leralta).

CHORLITEJO CHICO

Charadrius dubius

Canarias. En Gran Canaria, datos de cría en cotas máximas de altitud: el 14 de mayo de 2007 en el embalse de Chira, Cercados de Araña, San Bartolomé de Tirajana, a 905 m de altitud, se localiza una pareja alarmada al lado de un cuenco de nidificación, y a unos 5 m se halla un huevo abandonado, probablemente por molestias causadas por visitantes. El 21 de mayo de 2010 en un pequeño embalse de Risco Grande, Mogán, a 914 m



Alcaraván común *Burhinus oedicnemus*. El Paso (La Palma). Foto: Robert Burton.



Chorlitejo chico *Charadrius dubius*. Mogán (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

de altitud, se halla una pareja con tres pollos medianos (D. Trujillo). En La Palma, en sendas charcas de riego de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un juvenil entre el 16 y el 20 de septiembre de 2010 y dos ejemplares del 3 al 10 de marzo de 2011 (R. Burton). Una de ellas, el juvenil, fue visto también en el mismo sitio el 21 de septiembre de 2010 (I. Brito).

CHORLITEJO GRANDE

Charadrius hiaticula

Observaciones en el interior: cuatro ejemplares en un humedal estacional de Meco, Madrid, el día 4 de mayo (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

CHORLITEJO PATINEGRO

Charadrius alexandrinus

Canarias. En Gran Canaria, una hembra en las salinas de Arinaga, Agüimes, el 18 de septiembre de 2010 (R. Barone y R. Otto). En Tenerife, en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja en El Médano, Granadilla de Abona, una hembra –aparentemente inmadura–, en los bajíos cercanos a la punta del Bocinegro el 5 de octubre de 2010 (R. Barone y R. Jorge), y cerca del aparcamiento en el llano del aeropuerto viejo el 9 de noviembre de 2010 (J. A. Lorenzo), así como tres hembras en La Mareta el 24 de febrero de 2011 (S. Cherrug).

CHORLITO CARAMBOLO

Charadrius morinellus

Uno en el embalse de Santillana, Madrid, en noviembre y diciembre de 2007 (Ó. Díez Martínez). Cuatro aves en Villapún, Palencia, el 28 de diciembre de 2007 (R. Rodríguez). Dos aves en el Pico del Jierru, Macizo Oriental de Andara, Picos de Europa, municipio de Cillorigo y Camaleño, Cantabria, el 26 de agosto de 2010 (L. A. Rabanal). Un primer invierno en cabo de Peñas, Asturias, el 11 de octubre de 2010 (X. Cortés y C. Álvarez Usategui). Uno en Cariño, A Coruña, el 21 de octubre de 2010 (R. Hevia). Un juvenil en Guijo de Coria, Cáceres, los días 2 y 3 de noviem-

bre de 2010 (J. Prieta y S. Mayordomo). Bando con 36 individuos en sierra de Espuña, Murcia, el 9 de noviembre de 2010 (A. Powell).

Canarias. En Lanzarote, en los llanos del jable de Famara, Teguiise, el 10 de enero de 2002 se observa un bando de 15 ejemplares, mientras que el día 12 en ese mismo lugar se halla un ejemplar muerto (D. Trujillo, F. Siverio y P. Felipe). También en los llanos de Famara, en el mismo enclave donde se ha venido detectando en los últimos inviernos (véase *Ardeola*, 57: 228): tres aves en diciembre de 2010 (J. Rodríguez Martínez), y un grupo de al menos 50 ejemplares el 2 de enero de 2011 (J. Sagardía), aunque el 3 de febrero de 2011 se cuentan 25 aves (A. Unquiles Cobos), y posteriormente 23 ejemplares el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2011 (F. J. García Vargas); por último, dicho número de 23 aves el 7 de marzo de 2011 (F. J. García Vargas y J. Sagardía). En Tenerife, en llanos próximos a la charca de El Fraile, Arona, un grupo de 8 ó 9 ejemplares a mediados de octubre, y sólo cuatro el 29 de octubre de 2010 (V. Cardoso y G. Peña). También en esta isla, y a pocos kilómetros de la localidad anterior, en concreto en el llano del aeropuerto viejo de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en El Médano, Granadilla de Abona, dos aves el 28 de octubre de 2010 (M. Westberg y H. Persson). En La Palma, uno el 26 de septiembre de 2010 en sector con retamas, a unos 2.200 m de cota de altitud, aproximadamente en el kilómetro 31 de la carretera de acceso al Roque de los Muchachos, cerca de Pico de La Cruz (R. Burton).

CHORLITO DORADO EUROPEO

Pluvialis apricaria

Canarias. En Tenerife, en llanos próximos a la charca de El Fraile, Arona, tres aves el 28 de enero de 2011 (G. Peña y V. Cardoso).

AVEFRÍA EUROPEA

Vanellus vanellus

Canarias. En El Hierro, un ejemplar adulto en una charca de El Matorral, Frontera, el 20 de octubre de 2010 (J. L. Rodríguez).

CORRELIMOS GORDO*Calidris canutus*

Un individuo en plumaje nupcial en la Reserva Natural de las lagunas de Villafáfila, Zamora, entre el 18 y el 25 de mayo de 2010 (J. Á. Arriola y T. Sanz).

CORRELIMOS TRIDÁCTILO*Calidris alba*

Citas de interior: dos ejemplares en un humedal estacional de Meco, Madrid, en compañía de un correlimos común, el día 4 de mayo de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH) y un grupo de cinco ejemplares en la balsa de Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 8 de mayo de 2010 (D. Miguélez).

CORRELIMOS DE TEMMINCK*Calidris temminckii*

Un ejemplar en un humedal estacional de Meco, Madrid, el día 4 de mayo de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

CORRELIMOS OSCURO*Calidris maritima*

Uno en el espigón Juan Carlos I, Huelva, el 30 de octubre de 2010 (J. A. Lama). En Cádiz, un individuo en la playa de La Caleta, el 4 de febrero y, probablemente el mismo el 24 de marzo de 2010 (M. Jiménez Cintado), y dos aves en los corrales de Chipiona, el 3 de marzo de 2011 (F. Chiclana).

COMBATIENTE*Philomachus pugnax*

Mayor concentración registrada en Extremadura hasta el momento: 400 ejemplares en arrozales de Santa Amalia, Badajoz, el 30 de diciembre de 2010 (Á. Sánchez) y 300 aves el 29 de enero de 2011 (F. Yuste).

AGACHADIZA CHICA*Lymnocyptes minimus*

Dos aves capturadas para anillamiento en la desembocadura de la Rambla, Murcia, el 2 de

febrero de 2011 (C. Requena). Un ejemplar en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 3 de noviembre de 2010 (S. Peregrina). Un ave en el embalse de Pedrezuela, Madrid, el 19 de noviembre de 2010 (A. Ortega, G. Martín y Ó. Llama). En Soria, uno en Almonacid, el 21 de noviembre de 2010 (L. E. Molina) y tres en Alconaba, el 26 de marzo de 2011 (J. L. Hernández). Un ejemplar en el embalse de Arrocampo, Cáceres, el 12 de marzo de 2011 (S. Mayordomo y E. Palacios).

Canarias. En Lanzarote, una en el campo de golf de Tías el 10 de marzo (J. Sagardía), y de nuevo el 11 de marzo de 2011 (F. J. García Vargas). En La Palma, en charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un ejemplar el 26 de diciembre de 2010 (B. Dyke y A. Dyke).

AGACHADIZA COMÚN*Gallinago gallinago*

Posible reproducción en prados húmedos de Las Navas del Marqués, Ávila (véase Lorenzo y Planelles, 2010): cuatro aves en vuelo el 10 de abril de 2008, un ejemplar el 22 de abril, un macho oído entre el 6 de mayo y el 18 de junio (C. Clemente). Dos ejemplares en laguna de Chozas, Chozas de Arriba, León, el 22 de abril de 2009; se observa hasta finales de abril y en varias ocasiones a un macho realizando vuelos nupciales: elevándose y describiendo círculos a gran altura y dejándose caer con la cola extendida (A. Acebes, C. Zumalacárregui y D. Miguélez). En 2010, de nuevo un macho ejecutando vuelos de celo en esta misma laguna, el 22 de mayo de 2010 (H. Astiárraga y S. de Elera).

CHOCHA PERDIZ*Scolopax rusticola*

Canarias. En Lanzarote, un ejemplar cerca del campo de golf de Tegui el 2 de diciembre de 2010 (F. J. García Vargas).

ZARAPITO TRINADOR*Numenius phaeopus*

Registro invernal en el interior: un ejemplar en Santa Amalia, Badajoz, el 31 de enero de 2011 (Á. Sánchez).



Archibebe fino *Tringa stagnatilis*. Laguna de Fuente de Piedra (Málaga). Foto: Andy Paterson.

ARCHIBEBE FINO *Tringa stagnatilis*

Uno en la laguna Salada de Pétrola, Pétrola-Chinchilla, Albacete, el 1 de abril de 2009 (J. A. Cañizares, D. Cañizares, J. Camacho y R. Torralba). Uno en las salinas de Marchamalo, Mar Menor, Murcia, los días 11 y 17 de noviembre de 2010 (R. Howard). Un individuo en Villaviciosa, Asturias, permanece casi cinco meses, al menos entre el 18 de octubre de 2010 y el 8 de marzo de 2011 (A. Villaverde). En Cádiz, tres aves en las marismas de la Algaida, Sanlúcar de Barrameda, el 30 de septiembre de 2010 (R. Martín-Baylo, F. Chiclana y F. del Valle), uno en Sanlúcar de Barrameda, el 2 de octubre de 2010 (R. García) y el mismo día otro en Trebujena (J. L. Anguita y A. Savijn). Un ejemplar en las salinas del cabo de Gata, Almería, el 8 de febrero de 2011 (R. Martín). Uno en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 13 de abril de 2011 (A. Paterson, J. Oñate y A. Serrano).

ANDARRÍOS BASTARDO *Tringa glareola*

Primer registro invernal extremeño en la cuenca del Tajo: un ave en Sierra de Fuentes, Cáceres, el 31 de enero de 2011 (Á. Sánchez).

VUELVEPIEDRAS COMÚN *Arenaria interpres*

Un ejemplar en Esparragalejo, Badajoz, el 3 de octubre de 2010 (Á. Sánchez). En la Comunidad de Madrid, donde su presencia es muy rara: un macho y una hembra en un humedal estacional de Meco, en compañía de chorlitejos grandes, el día 4 de mayo de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

FALAROPO PICOGRUESO *Phalaropus fulicarius*

Segunda cita para la provincia de Albacete: un adulto en plumaje invernal en la laguna Salada de Pétrola, el 3 de diciembre de 2009 (L. Pareja, R. Torralba y D. Cañizares). En Cantabria, cuatro aves en paso por Cabo Mayor, Santander, el 1 de noviembre de 2010 y 11 aves el día 11 de noviembre y uno en Oyambre, el 13 de noviembre de 2010 (A. García Herrera). Un ave en Getxo, Vizcaya, el 13 de noviembre de 2010 (R. Herrero). Uno en el delta del Ebro, Tarragona, el 20 de noviembre de 2010 (J. Ventura). Tres ejemplares en la laguna de Pitillas, Navarra, el 24 de noviembre de 2010 (M. Gálvez). Un juvenil en el embalse del Cancho del Fresno, Cañamero, Cáceres, el 2 de octubre de 2010 (S. Mayordomo). Uno en la laguna del Longar, Lillo, Toledo, el 13 de noviembre de 2010 (J. Portillo). Uno en el Espigón Juan Carlos I, Huelva, el 10 de noviembre de 2010 (F. Chiclana). Un ejemplar en las salinas de Marchamalo, Mar Menor, Murcia, del 10 al 17 de noviembre de 2010 (R. Howard). Un ave en Santa Pola, Alicante, el 23 de diciembre de 2010 (J. A. Ramos). Un ejemplar en Chipiona, Cádiz, el 5 de febrero de 2011 (R. García).

PÁGALO POMARINO *Stercorarius pomarinus*

Canarias. En Lanzarote, en aguas frente al Parque Nacional de Timanfaya, dos adultos el 12 de septiembre de 2010, y cerca de Fuerteventura, otros dos adultos frente a la Baja de Amanay el 18 de septiembre de 2010, mientras que en las proximidades del faro de Jandía se detecta un adulto y

un pequeño grupo constituido por dos juveniles y otro adulto el 19 de septiembre de 2010 (C. Gutiérrez Expósito).

GAVIOTA CABECINEGRA

Larus melanocephalus

En Badajoz en 2010, en el basurero de Mérida, un ejemplar el día 4 y dos aves el día 7 de noviembre, y dos aves en el río Guadiana, Mérida, el 25 de diciembre (Á. Sánchez).

GAVIOTA ENANA

Larus minutus

Unas 4.000 aves en paso por Punta de la Vaca, Asturias, el 10 de noviembre de 2010; y 3.185 el día 10 del mismo mes (D. López Velasco, M. Pajuelo, C. Álvarez Usategui, M. García, N. Castelao y X. Cortés). Un adulto en Villafáfila, Zamora, el 7 de enero de 2011 (D. González).

GAVIOTA REIDORA

Larus ridibundus

Nuevo caso de reproducción en la laguna de Meco en la temporada 2010, donde se comprobó su reproducción en 2009 con una pareja incubando, que finalmente fracasa (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

GAVIOTA PICOFINA

Larus genei

Observación de 149 ejemplares en Calatilla, marismas del Odiel, Huelva, el 9 de agosto de 2010 (F. Chiclana). El número de ejemplares que se observan en la Bahía de Cádiz sigue en aumento: hasta 115 aves en las salinas de la Tapa, el 2 de septiembre de 2010 (M. Jiménez Cintado).

GAVIOTA DE AUDOUIN

Larus audouinii

Crían con éxito 140 parejas en el delta del Llobregat, Barcelona, en la temporada de 2010 (F. López). Un juvenil en el basurero de Mérida, Badajoz, el 5 de octubre de 2010 (Á. Sánchez).



Gaviota de Delaware *Larus delawarensis*. Puerto de Málaga (Málaga). Foto: Salvador García.

GAVIOTA DE DELAWARE

Larus delawarensis

Observaciones en la provincia de A Coruña, todas de un individuo adulto: en Insua, Ponteceso, el 10 de octubre de 2010 (J. Vázquez); en Valdoviño, el 27 de noviembre de 2010 (P. Gutiérrez) y el 10 de diciembre de 2010 (A. Gutiérrez); en la ría de Burgo, el 10 de diciembre de 2010 (A. Gutiérrez); en Ares, del 21 de enero (T. Salazar) al 19 de febrero de 2011 (D. Calleja, P. Gutiérrez y A. Gutiérrez); posiblemente el mismo ejemplar que visita la zona cada invierno; en Finisterre, entre el 23 de enero y el 20 de febrero de 2011 (F. Arce, D. López Velasco, F. Pereiras y otros). En Pontevedra, un ave de segundo invierno en El Grove, el 8 de enero de 2011 (D. D. Romai). Un primer invierno en el Parque de Isabel La Católica, Gijón, Asturias, del 25 de febrero al 20 de marzo de 2011; se trata de la única observación en esta localidad donde años atrás la especie era regular en pequeño número (D. López Velasco, F. López, S. Bosch y otros). En Cantabria, un primer invierno en Pedreña, el 22 de noviembre de 2010 (Y. Borremans) y un individuo en Reserva Natural Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el 8 de febrero de 2011 (A. Sánchez). Un ejemplar en Getxo, Vizcaya, el 13 de noviembre de 2010 (R.

Herrero) y el 10 de febrero de 2011 (G. Ocio). Un segundo invierno en Fuenterrabía, Guipúzcoa, del 12 al 27 de marzo de 2011 (R. Rodríguez y M. Grande). Un ave de segundo o tercer invierno en el puerto de Málaga y en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, al menos entre el 20 de febrero y el 31 de marzo de 2011 (S. García Barcelona, A. Tamayo, A. Paterson y otros). Un primer invierno en Vélez-Málaga, Málaga, entre el 7 y el 19 de marzo de 2011 (S. García Barcelona, G. Lage y otros).

GAVIOTA CANA

Larus canus

Un individuo de primer invierno en la playa de La Caleta, Cádiz, desde el 18 de enero hasta el 17 de febrero de 2010 (M. Jiménez Cintado). En Badajoz, un ave y dos en el basurero de Mérida, los días 7 y 28 de noviembre de 2010, y un individuo en el río Guadiana, Mérida, el 25 de diciembre de 2010 (Á. Sánchez). Un primer invierno en el embalse de Sierra Brava, Cáceres, el 13 de enero de 2011 (N. P. Roberts). En la provincia de Zamora: un adulto y un segundo invierno en el embalse de Ricobayo, el 4 de enero de 2011 (J. A. Hernández); un primer invierno en el VRSU (vertedero) de Zamora los días 7 de diciembre de 2010 (M. Rouco), 14 de diciembre de 2010 y 26 de enero de 2011 (M. Blanco), y un primer invierno en las lagunas de Villafáfila, desde el 20 de diciembre de 2010 al 12 de febrero de 2011 (J. M. Pérez García, J. J. Orduña y otros). En Madrid, un primer invierno en el embalse de Pedrezuela, el 12 de enero de 2011 (J. A. Matesanz) y tres aves de primer invierno y una de segundo invierno en el VRSU de Colmenar Viejo, el 23 de enero de 2011 (D. González). Un ave de primer invierno en Salburúa, Álava, el 18 de diciembre de 2010 (D. Martínez Andrade y G. Ruiz del Río). Un primer invierno en Zaragoza el 25 de enero de 2011 (L. Gracia). Uno de segundo invierno en Los Caracoles, Aznalcázar, Espacio Natural de Doñana, Sevilla, el 14 de diciembre de 2010 (F. del Valle y F. Chiclana). Varias observaciones en la provincia de Málaga: un ave de segundo invierno en la Finca la Mayora, Algarrobo Costa, el 4 de diciembre de 2010 (S. García Barcelona y S. Saldaña); un individuo de primer invierno en el

puerto de Málaga el 6 de diciembre de 2010 (S. García Barcelona y S. Saldaña); uno de primer invierno junto con 600 gaviotas cabecinegras y 250 gaviotas sombrías en la playa de Torre del Jaral, Vélez-Málaga, el 15 de diciembre de 2010 (S. García Barcelona) y en esta misma playa uno de segundo invierno junto con 1.600 gaviotas cabecinegras, el 31 de diciembre de 2010 (S. García Barcelona); un ejemplar en el puerto de Málaga el 26 de febrero de 2011 (G. Martín, H. Koskinen y S. García Barcelona), y cuatro ejemplares en un grupo de unas 2.500 gaviotas cabecinegras. Se trata de ejemplares distintos, dos de primer verano, uno de segundo verano y un adulto, todos observados de forma simultánea, en la playa de Chilches, Vélez Málaga, el 10 de abril de 2011 (S. García Barcelona).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA

Larus argentatus

Un primer invierno en el puerto de Málaga el 2 de enero de 2011 (H. Koskinen). En Madrid, un ave de tercer año en el embalse de Santillana, el 18 de diciembre de 2010 (H. Koskinen) y un adulto en el VRSU (vertedero) de Colmenar Viejo, el 16 de enero de 2011 (J. M. Ruiz y D. González). Dos aves de segundo año en el VRSU de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 15 de enero de 2011 (G. Martín). Un ejemplar correspondiente a la subespecie *argenteus* en el puerto de Málaga, Málaga, el 26 y 27 de febrero de 2011 (G. Martín, H. Koskinen y S. García Barcelona).



Gaviota argentea *Larus argentatus*. Puerto de Málaga (Málaga). Foto: Salvador García.

GAVIÓN ATLÁNTICO*Larus marinus*

En Madrid, un ave de cuarto invierno en el VRSU (vertedero) de Colmenar Viejo, los días 3 y 8 de octubre de 2010 (M. Juan, D. González, J. M. Ruiz y J. Marchamalo) y un primer invierno en el VRSU de Pinto el 17 de diciembre de 2010 (J. Marchamalo). En Girona, un ave en Palamós, el 10 de diciembre de 2010 (D. López Velasco, P. Fernández y P. J. Menéndez) y un primer invierno en Llagostera el 12 de diciembre de 2010 (C. Álvarez Cros). En el VRSU de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, un primer invierno el 13 de noviembre de 2010 y un ave de segundo año el 15 de enero de 2011 (G. Martín). Un primer invierno en el embalse de La Almendra, Salamanca, el 9 de enero de 2011 (J. J. Ramos Encalado). Primer registro de la especie para Ceuta: un ejemplar observado el 16 de marzo de 2011 (M. A. Guirado).

GAVIOTA TRIDÁCTILA*Rissa tridactyla*

Canarias. En Tenerife, el 1 de agosto de 2009 en la costa debajo del hotel Maritim, Los Realejos, se halla el cadáver de un adulto, y el 22 de octubre de 2009 en Lago Abama, Guía de Isora, otro adulto también muerto (D. Trujillo). Aunque algo más tardías, estas citas complementan la información del invierno 2008/2009 (véase *Ardeola*, 56: 165-167).

PAGAZA PIQUIRROJA*Sterna caspia*

Cuatro ejemplares en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 16 de octubre de 2010 (A. M. Pérez). Un adulto en Málaga el 26 de enero de 2011 (G. Olios). Un ejemplar en las salinas de Santa Pola, Alicante, el 13 de febrero de 2011 (V. de la Torre, M. Labrador, M. Llorente y Á. Díaz).

CHARRÁN COMÚN*Sterna hirundo*

Un adulto en el embalse de San José, Castronuño, Valladolid, el 10 de noviembre de 2010 (J. J. Ramos Encalado).

CHARRANCITO COMÚN*Sterna albifrons*

Durante el paso prenupcial se cuenta un mínimo de 2.550-2.700 aves en la playa de Levante, bahía de Cádiz, Cádiz, el 16 de abril de 2010 (R. García). Observación en invierno: dos aves en las salinas de isla Cristina, Huelva, el 29 de enero de 2011 (F. Chiclana y J. A. Lama). Varios ejemplares en Ayamonte, Huelva, el 1 de febrero de 2011 (R. Romero).

FUMAREL CARIBLANCO*Chlidonias hybrida*

Se confirma de nuevo la reproducción en la Comunidad de Madrid, con unas 9 parejas reproductoras en la laguna de Meco en la primavera de 2010 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH). Registro invernal: cinco aves en las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 5 de diciembre de 2010 (R. Romero).

FUMAREL ALIBLANCO*Chlidonias leucopterus*

Un juvenil en el embalse de Trasona, Asturias, los días 1 y 2 de octubre de 2010 (X. Cortés). Un juvenil en la ría de Nervión, Bilbao, Vizcaya, el 2 de octubre de 2010 (A. Rodrigo). Un adulto en Abegondo, A Coruña, el 7 de octubre de 2010 (X. Varela). Un juvenil en Begonte, Lugo, los días 9 y 10 (F. Pereiras) y 11 de octubre de 2010 (T. Salazar). Un adulto en plumaje nupcial en la laguna Salada de Pétrola, Albacete, el 24 de abril de 2009 (R. Galindo, A. Zamora, S. González, J. Giménez, P. L. Lozano, J. A. Cañizares y D. Cañizares). Dos adultos en la laguna Salada de Pétrola, Albacete, el 28 de abril de 2010 (J. A. Cañizares).

GANGA ORTEGA*Pterocles orientalis*

Canarias. En Lanzarote, una pareja en el campo de golf de Tías el 14 de septiembre de 2010 (F. J. García Vargas).

PALOMA RABICHE*Columba junoniae*

Canarias. En Tenerife, el 2 de mayo de 2002 en riscos cercanos a la gasolinera de Las Aguas, San Juan de La Rambla, se observan dos aves, y el 13 de abril de 2007 se detectan tres individuos, uno de ellos exhibiendo vuelo de cortejo; nuevamente, en el mismo enclave, un ejemplar con el mismo comportamiento el 14 de abril de 2009 y el 27 de abril de 2010 (D. Trujillo).

TÓRTOLA EUROPEA*Streptopelia turtur*

Canarias. En Gran Canaria, en uno de los transectos realizados para el Atlas de Aves Invernantes en España de SEO/BirdLife se observa un individuo en Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 21 de enero de 2009 (D. Trujillo).

TÓRTOLA TURCA*Streptopelia decaocto*

Alrededor de 400 aves en un olivar en Salteras, Sevilla, el 23 de octubre de 2010 (A. Domínguez).

TÓRTOLA SENEGALESA*Streptopelia senegalensis*

Canarias. En Tenerife, el 15 de mayo de 2009 en Santo Domingo, La Guancha, se observa un ejemplar que tras levantarse del suelo se posa encima de un muro y, a los pocos segundos, emprende el vuelo (D. Trujillo y J. J. Jiménez).

CUCO COMÚN*Cuculus canorus*

Un ejemplar de la fase rojiza es capturado para anillamiento en Villajimena, Palencia, el 25 de junio de 2009 (A. León).

LECHUZA COMÚN*Tyto alba*

Canarias. En Gran Canaria, el 15 de septiembre de 2010 cerca de El Sequero, San Bartolomé de

Tirajana, a unos 1.000 m de altitud –probablemente la cota más alta donde se ha detectado la especie en esta isla–, un ejemplar posado en cable telefónico en la carretera general (D. Trujillo y V. Suárez).

BÚHO CHICO*Asio otus*

Dormidero con 15 ejemplares en el pinar de La Algaida, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 24 de diciembre de 2010 (J. J. Díaz Díaz).

Canarias. En Lanzarote, uno atropellado por un coche cerca del vertedero de Zonzamas, Arrecife, el 19 de septiembre de 2010 (J. Sagardía). En Tenerife, dato de reproducción tardía: el 4 de octubre de 2002 en San José, San Juan de La Rambla, durante la noche se escucha un pollo solicitando alimento (D. Trujillo).

BÚHO CAMPESTRE*Asio flammeus*

Se cuentan 30 ejemplares en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 13 de febrero de 2011 (A. Plata).

VENCEJO UNICOLOR*Apus unicolor*

Canarias. En Gran Canaria, dato de reproducción tardía: el 8 de septiembre de 2010 en un nido ubicado en una grieta de una pared rocosa anexa a la presa de los Hornos, Tejeda, a 1.550 m de altitud, se oyen pollos después de entrar un adulto (D. Trujillo).

VENCEJO PÁLIDO*Apus pallidus*

Un ejemplar en Urrez, Burgos, el 31 de octubre de 2010 (J. J. Ramos). Se observan 12 aves en la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, el 24 de diciembre de 2010 (A. Domínguez). Registros en enero: un grupo de 15 ejemplares en el embalse de Alange, Badajoz, los días 3, 4, y 5 de enero de 2011 (J. Solana). Un ejemplar en Plasencia, Cáceres, el 26 de enero de 2011 (S. Mayor-domo).

VENCEJO CAFRE*Apus caffer*

Un ejemplar alejado de la zona de cría habitual en la provincia, probablemente en paso, en Llanos de Guerra, Puerto Rea, Cádiz, el 22 de mayo de 2010 (M. Jiménez Cintado).

ABEJARUCO COMÚN*Merops apiaster*

Canarias. En El Hierro, donde hay pocos datos y sería la segunda cita: el 20 de junio de 2000 en La Dehesa, Frontera, se observa un ejemplar en vuelo (D. Trujillo).

TORCECUELLO EUROASIÁTICO*Jynx torquilla*

Canarias. En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tías el 8 de septiembre de 2010 (F. J. García Vargas).



Alondra ricotí *Chersophilus duponti*. Albufera de Valencia (Valencia). Foto: Toni Alcocer.

ALONDRA RICOTÍ*Chersophilus duponti*

Primera cita realizada hasta la fecha en la albufera de Valencia: un ejemplar, con características de la subespecie ibérica *duponti*, en las dunas litorales próximas a El Pujol, en la Devesa de l'Albufera, el 9 de enero de 2010 (T. Alcocer, B. Dies, V. Llorens, P. Marín, M. Piera y P. Ruiz). La observación podría estar relacionada con el fuerte temporal de nieve que ha venido afectando al interior de la península Ibérica y a zonas cercanas con la presencia de esta especie. Se vuelve a localizar de nuevo en el mismo lugar el 10 de enero (T. Alcocer) y el día 12 (D. Hegedüs).

ALONDRA COMÚN*Alauda arvensis*

Canarias. En Gran Canaria, el 19 de enero de 2010 en Las Mejías, Ingenio, tres aves en huertas abandonadas, y el 23 de enero de ese año, cerca de Juncalillo, Gáldar, dos ejemplares en zona de cultivos (D. Trujillo). En Tenerife, en pastizales de Teno Alto, Buenavista del Norte, el 13 de abril de 2000 se observa un ejemplar con comportamiento que quizás denote cortejo de esta especie en la localidad: levanta vuelo en tres ocasiones desde el suelo y bate las alas casi sin avanzar, manteniéndose a unos 10 m de altura a la vez que reclama casi de forma ininterrumpida; el ave volvía siempre al punto de partida y también reclamó posada en una piedra (D. Trujillo).

AVIÓN ZAPADOR*Riparia riparia*

En periodo invernal: en Puebla del Rio, Sevilla, tres ejemplares en el Brazo del Este, el 9 de diciembre de 2010 (F. Chiclana) y varias aves en la Dehesa de Abajo, el 24 de diciembre de 2010 (A. Domínguez), y uno en Trujillo, Cáceres, en la primera semana de enero de 2011 (J. Rokkanen).

Canarias. En El Hierro, el 19 de septiembre de 1996 se avista un ejemplar sobrevolando estanques de Frontera, y en esa misma localidad se detecta un ave el 19 de junio de 2000 y tres individuos el 17 de abril de 2004 (D. Trujillo).

GOLONDRINA COMÚN*Hirundo rustica*

Alrededor de 203 aves en la Cañada de la Rianzuela, Doñana, Sevilla, el 20 de diciembre de 2010 (F. Chiclana y J. Garzón).

GOLONDRINA DÁURICA*Hirundo daurica*

Un ave en San Pedro del Pinatar, Murcia, el 2 de enero de 2011 (I. Bartolomé). Al menos un ejemplar invernante, en un bando de avión roquero, en el Salto del Gitano, Monfragüe, Cáceres, observado varias veces en la segunda mitad de diciembre de 2010 (C. Mills y J. M. Benítez). Datos de reproducción para la provincia de León: una pareja cría con regularidad desde el año 2008 en un nido usurpado a una pareja de golondrinas comunes en Yugueros; en la temporada 2010 sacaron adelante dos pollos (D. González); siete aves en Velilla de Valdoré, el 7 de mayo de 2009, que posteriormente no vuelven a ser localizados (A. L. Cantonal); varios ejemplares en Cistierna, en una zona de roquedo junto al río Esla apropiada para la cría, el 15 de septiembre de 2009 (J. Á. Arriola); se descubre un nido en construcción bajo un puente en Vidanes, León, en la primavera de 2009, se localizaba junto a otro nido posiblemente ocupado la temporada anterior; en posteriores visitas se observaron a los dos adultos entrando en el nido pero no pudo ser comprobado el resultado de la cría (J. Á. Arriola y T. Sanz) y un ejemplar integrado en un grupo de golondrinas comunes en La Ercina, León, el 6 de mayo de 2010 (T. Sanz).

AVIÓN COMÚN*Delichon urbicum*

Alrededor de 200 ejemplares en la Cañada de la Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 20 de diciembre de 2010 (F. Chiclana y J. Garzón).

BISBITA DE RICHARD*Anthus richardi*

En A Coruña: en Muxía, tres aves el 15 de octubre (F. Pereira) y cuatro el 8 de diciembre de 2010 (A. Salazar); una en Cariño, el 5 de noviembre de 2010 (R. Hevia), dos aves en Ortigueira, el 23 de

noviembre de 2010 (J. M. Alonso) y 12 ejemplares en Corrubedo, el 30 de enero de 2011 (M. Polo). En Lugo: en Ribadeo, dos aves el 20 de octubre y cuatro aves del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2010 (L. J. Cantil, J. M. Alonso y otros), y uno en Cospeito, el 7 de diciembre de 2010 (R. Hevia). Tres aves en Gozón, Asturias, el 25 de marzo de 2011 (M. Quintana y C. Álvarez Usategui). En Cantabria: en Bareyo, tres aves desde 9 de octubre al 12 de noviembre de 2010, cinco el 24 de noviembre y nueve ejemplares del 29 de noviembre de 2010 al 27 de febrero de 2011 (A. Ruiz Elajalde); uno en Isla, el 9 de octubre de 2010 (A. Ruiz Elajalde), y en Ribamontán, uno el 9 de octubre de 2010 y cuatro el 13 de enero de 2011 (J. Ardaiz). En Girona, dos aves en Pals, el 25 de diciembre de 2010 (A. Burgas y D. Burgas); uno en Torroella de Montgrí, los días 28 de diciembre de 2010 y 9 y 22 de enero de 2011 (J. Pérez Castaño) y un individuo en Aiguamolls del Ampurdán, Girona, el 28 de marzo de 2011 (A. Ollé). Uno en el delta del Ebro, Tarragona, entre el 21 de diciembre de 2010 y el 23 de febrero de 2011 (D. Bigas, P. Josa y otros). Un individuo en L'Ampolla, Tarragona, el 23 de marzo de 2011 (M. Sánchez Blanch). En la albufera de Valencia: un ejemplar el 27 de octubre, dos el 6 de noviembre y cuatro el 2 de diciembre de 2010 y el 5 de enero de 2011 (B. Díes). En Cullera, Valencia: un ave el 27 de octubre de 2010 y dos ejemplares del 27 de febrero al 15 de marzo de 2011 (M. Piera). Dos aves en el Marjal del Moro, Valencia, el 4 de enero de 2011 (A. Alamán). En Alicante, dos aves en Santa Pola los días 27 y 31 de octubre de 2010, y un ejemplar en Fontcalent el 23 de noviembre de 2010 (J. Merayo y G. Mayor). Tres ejemplares en Los Nietos, Murcia, el 27 de octubre de 2010 (C. Requena). Un ave en el P. N. Guadalhorce, Málaga, el 20 de octubre (S. Peregrina) y el 16 de diciembre de 2011 (A. Tamayo).

BISBITA GORGIROJO*Anthus cervinus*

Un ejemplar en Río Grande, Málaga, el 3 de marzo de 2011 (S. Peregrina).

Canarias. En Gran Canaria, el 5 de marzo de 2011 en salinas abandonadas de la playa de Corral Espino, San Bartolomé de Tirajana, se observan dos ejemplares (D. Trujillo). En La Palma,

en charca de riego de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un individuo entre el 19 y el 25 de noviembre de 2010 (R. Burton).

LAVANDERA BOYERA

Motacilla flava

Un ejemplar en Sollana, Valencia, el 9 de enero de 2011 (J. Puentes y V. Esteller). En Puebla del Río, Sevilla: uno en la Dehesa de Abajo el 24 de diciembre de 2010 (A. Domínguez) y dos aves de la subespecie *flava* en el Brazo del Este el 9 de diciembre de 2010 (F. Chiclana).

Canarias. En La Palma, en las salinas de Fuencaiente, dos aves el 24 de septiembre de 2010 (R. Burton).

LAVANDERA BLANCA

Motacilla alba

Observaciones correspondientes a la subespecie *yarrellii*: al menos 8 ejemplares en cabo Billano, Gorliz, Vizcaya, el 29 de octubre de 2010; uno de los individuos portaba anillas de colores y correspondía a un ejemplar capturado y marcado el 4 de octubre de 2006 en Slapton (South Devon, Reino Unido) por lo que se le calcula una edad de 4 años y medio. Anteriormente a esta observación ya había sido vista en la misma zona, cabo Billano, el 13 de enero de 2008 (I. Sarabia). Una hembra en el puerto de Mazagón, Huelva, el 23 de noviembre de 2010 (J. A. Lama, M. Martín y F. Chiclana). Una hembra en el Brazo del Este, Puebla del Río Sevilla, el 9 de diciembre de 2010 (F. Chiclana).

Canarias. En Lanzarote, dos aves de la subespecie *yarrellii* en Playa Blanca, Yaiza, el 11 de diciembre de 2010 (F. J. García Vargas y J. Sagardía).

ACENTOR ALPINO

Prunella collaris

Observaciones en Extremadura: en Cáceres, seis bandos con 40 aves en paso sobre Ladrillar, Cáceres, el 15 de noviembre de 2010 y un grupo de 15 aves en el puerto de Esperabán, Pinofranqueado, el 12 de febrero de 2011; y en Badajoz se cuentan hasta 22 aves en Monesterio, Badajoz, el 26 de diciembre de 2010 (A. Pacheco).

MIRLO CAPIBLANCO

Turdus torquatus

Un ejemplar en Navarredonda de Gredos, Ávila, el 24 de abril de 2010 (D. Langlois y S. Langlois). **Canarias.** En Lanzarote, uno en Maguez, Haría, el 3 de noviembre de 2010 (F. J. García Vargas).

MIRLO COMÚN

Turdus merula

Canarias. En Lanzarote, uno en Uga el 23 de noviembre de 2010 (F. J. García Vargas) y de nuevo allí el 11 de diciembre de 2010 (J. Sagardía), así como otro ejemplar cerca del campo de golf de Tegui el 25 de diciembre de 2010 (F. J. García Vargas). De acuerdo con este observador, este último ejemplar podría ser el mismo visto en ese lugar en agosto de 2010 (véase *Ardeola*, 57: 543).

ZORZAL REAL

Turdus pilaris

Canarias. En Lanzarote, los días 8, 17 y 24 de febrero de 2000 cerca del pueblo de Tías, en una pequeña agrupación de tabaco moro (*Nicotiana glauca*) se observó un individuo adulto (D. Trujillo). En esta misma isla, uno en el campo de golf de Tías los días 19 y 28 de noviembre de 2010 y todo el mes de diciembre de 2010 (F. J. García Vargas), así como los días 2, 4 y 24 de enero de 2011 (F. J. García Vargas, J. Sagardía y A. Unquiles Cobos).



Zorzal real *Turdus pilaris*. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

ZORZAL ALIRROJO*Turdus iliacus*

Canarias. En Lanzarote, uno en Haría el 3 de enero de 2011 (F. J. García Vargas).

ZORZAL COMÚN*Turdus philomelos*

Canarias. En Gran Canaria, el 12 de enero de 2009 en Pico Viento, Gáldar, se detectan cuatro individuos, mientras que el 14 de octubre de 2009 en vegetación anexa a la presa de los Hornos, Tejeda, se observa un ejemplar (D. Trujillo y A. Delgado). En El Hierro, donde hay muy pocos datos previos, durante el año 1995 se recabó la siguiente información: el 19 de noviembre en cultivos de la zona baja de Frontera se observa un ejemplar; el 4 de diciembre en la vaquería cercana a Tiñor, Valverde, se avista un individuo, y tres más, a la entrada de este pueblo; el día 6 de diciembre en montaña Pedraje, Valverde, se detecta un ave (D. Trujillo y R. Barone).

BUSCARLA PINTOJA*Locustella naevia*

Registro invernal: un ejemplar en Haces, Llanes, Asturias, los días 16 y 18 de diciembre de 2010 (F. Nieto).



Buscarla pintoja *Locustella naevia*. Haces, Llanes (Asturias). Foto: Fran Nieto.

CARRICERÍN COMÚN*Acrocephalus schoenobaenus*

Canarias. En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tías el 22 de octubre de 2010 (J. Sagardía).

CURRUCAZARCERA*Sylvia communis*

Canarias. En Fuerteventura, el 29 de septiembre de 2009 en Pozo Negro, Antigua, se detecta un individuo juvenil (D. Trujillo).

CURRUCAMOSQUITERA*Sylvia borin*

Canarias. En Lanzarote, una en Uga, Yaiza, el 6 de noviembre de 2010 (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO IBÉRICO*Phylloscopus ibericus*

Se escucha semanalmente el canto de un macho defendiendo territorio, en una zona de soto en el paraje conocido como Casa de las Palomas, Casas de Lázaro-Peñascosa, Albacete, desde el 7 de mayo 2010 hasta el 16 de junio, cuando que se escucha por última vez. Además, se captura para anillamiento el 4 de junio un macho con protuberancia cloacal evidente (D. Cañizares).



MOSQUITERO MUSICAL*Phylloscopus trochilus*

Canarias. En Fuerteventura, en el islote de Lobos, La Oliva, el 1 de abril de 2010 se observa un individuo en la vegetación junto al sendero que conduce a La Caldera (D. Trujillo). En Gran Canaria, en la Reserva Natural Integral de Inagua, Ojeda y Pajonales, se han obtenido los siguientes datos: en El Agujero el 17 de mayo de 2007 un ejemplar y dos al día siguiente. Entre el 26 y 28 de abril de 2008 se registran decenas de individuos en diversas zonas de la Reserva, mientras que el 9 de mayo de 2008 se detecta un ave en el barranco de los Cardos, al día siguiente, otro ejemplar cerca de montaña de la Negra, y el 12 de mayo de ese año se observa un individuo en el lomo Barbusano. Por último, el 22 de agosto de 2010, en el barranco del Sao se captura un ejemplar durante una jornada de anillamiento (D. Trujillo).

REYEZUELO SENCILLO*Regulus regulus*

Tres ejemplares en el río Ciudadreja, Sevilla, el 15 de noviembre de 2008 (COCN). En Sevilla, tres individuos en Utrera, el 19 de enero de 2006 y un macho joven capturado para anillamiento el 14 de noviembre de 2010 (M. Gálvez), y un ejemplar capturado para anillamiento en el Brazo del Este, el 13 de noviembre de 2010 (GOSUR).

PAPAMOSCAS CERROJILLO*Ficedula hypoleuca*

Canarias. En Gran Canaria, los días 26 y 28 de abril de 2008, en la Reserva Natural Integral de Inagua, Ojeda y Pajonales, se detectan al menos varias decenas de individuos, probablemente centenares. Entre los ejemplares observados se identifican ocho machos en distintas fases de desarrollo de su plumaje nupcial. Además, el 28 de abril de 2008 en Agaete se detecta un macho. Entre el 5 y 17 de septiembre de 2010 en pinar de pino canario (*Pinus canariensis*) del cortijo de los Hornos, Tejeda, se avistan varios ejemplares: hasta cinco aves el día 8 y sólo dos el día 17. En el interior o en las cercanías de la Reserva mencionada, el 5 de septiembre de 2010 en el Cortijo de

Inagua se avista un ave; el 13 de ese mismo mes y año en el aula de la naturaleza de Inagua, otra, y al día siguiente, un individuo en el Morro de la Negra (D. Trujillo).

BIGOTUDO*Panurus biarmicus*

Primeras citas para la provincia de Álava: en laguna de La Laguardia, El Prao de la Paul, dos machos y dos hembras el 26 de diciembre de 2010 (B. Webster), posteriormente se vuelve a avistar un macho y una hembra, el 10 de enero de 2011 (R. Arambarri) y un macho el 15 de enero (L. Lobo). En el embalse de Arrocampo, Cáceres: un ejemplar el 15 de enero de 2011 (M. Kelsey), y en marzo: un ave el día 12 (S. Mayordomo y E.



Bigotudo *Panurus biarmicus*. Complejo lagunar de Laguardia, balsa de Lapaúl, Vitoria (Álava). Foto: Brian Webster.

Palacios), dos machos y una hembra el día 18 (S. Mayordomo), tres aves el día 20 (D. Langlois, J. Briz, S. Langlois, Ó. González y Ó. Llama) y un individuo el día 25 (S. Mayordomo).

TREPADOR AZUL

Sitta europaea

Dos ejemplares en la Pantaneta de Alhama, Alhama de Granada, Granada, el 19 de septiembre de 2010 (F. Molina Jiménez, J. A. López Molina y M. Arellano).

TREPARRISCOS

Tichodroma muraria

Uno en el Salto del Gitano, Monfragüe, Cáceres, el 11 de octubre de 2010 (T. Marbett y G. Marbett). Uno en la presa de Jándula, Jaén, el 14 de noviembre de 2010 (F. J. García). Un individuo en Grazalema, Cádiz, el 1 de noviembre de 2010 (S. Peregrina).

ALCAUDÓN DORSIRROJO

Lanius collurio

Un individuo joven en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 21 de septiembre de 2010 (E. Alba Padilla).

RABILARGO

Cyanopica cyana

Un ejemplar en El Hondo, Elche, Alicante, el 12 de febrero de 2011 (J. Vázquez).

CHOVA PIQUIGUALDA

Pyrhacorax graculus

Observación en el sur: un ave fotografiada en Montejaque, Málaga, el 19 de enero de 2011 (P. Jones).

CHOVA PIQUIRROJA

Pyrhacorax pyrrhacorax

Cinco ejemplares a 1.700 m s.n.m en la Peña de Francia, Salamanca, el 27 de septiembre de 2010 (A. Pacheco y M. A. García Mejías).

GRAJA

Corvus frugilegus

Tres ejemplares en un grupo de 450 cornejas, en Casalarreina, La Rioja, el 31 de diciembre de 2010 (D. Martínez Andrade y G. Ruiz del Río). Dos aves en Portelrubio, Soria, el 7 de febrero de 2011 (P. Soto). Dos ejemplares en Villafáfila, Zamora, el 20 de febrero de 2011 (J. Ruiz y P. Tapia).

GORRIÓN MOLINERO

Passer montanus

Canarias. En Gran Canaria, el 17 de marzo y el 28 de abril de 2010 en El Agazal, La Gaza, Gáldar, se localiza una colonia compartida con gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*) que nidifican en agujeros de bloques de una edificación. Se observaron varios ejemplares adultos transportando alimento y entrar a los nidos, estimándose los efectivos de esta especie en unas 4-6 parejas (D. Trujillo).

GORRIÓN CHILLÓN

Petronia petronia

Canarias. En Tenerife, en el pueblo de Vilaflor, dos ejemplares el 21 de febrero de 2011 (S. Cherug).



Gorrión molinero *Passer montanus*. Gáldar (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

OBISPO CORONIGUALDO*Euplectes afer*

Bando de alrededor de 400 aves en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla, el 9 de diciembre de 2010 (F. Chiclana).

VERDECILLO*Serinus serinus*

Canarias. En Gran Canaria, el 4 de marzo de 2008 en las cercanías del cortijo de Inagua, La Aldea, se detecta un macho cantando y persiguiendo a otro ejemplar, y el día 25 de ese mismo mes y año, nuevamente hay allí un macho que canta en el mismo enclave, mientras que el 26 de agosto de 2010, durante una jornada de anillamiento se captura un macho (D. Trujillo y V. Suárez). En esta misma isla, el 19 de enero de 2010 en Las Mejías, Ingenio, se observan tres ejemplares (un macho, una hembra y otro individuo); el 2 de mayo de 2010 en llanos Pelados, San Bartolomé de Tirajana, a 930 m de altitud, se detecta un macho cantando en pino canario (*Pinus canariensis*); el 25 de mayo de ese año en el mismo municipio, en concreto en Cercados de Araña, se avista un macho cantando también sobre pino canario, y otro que es atraído por éste; por último, el 17 de enero de 2010 en finca de frutales por debajo del pueblo de Fataga, San Bartolomé de Tirajana, se observan dos machos (D. Trujillo).

VERDERÓN SERRANO*Serinus citrinella*

Varios ejemplares en un pinar del término de Peñausende, Zamora, en un bando de verderones comunes, el 21 de noviembre de 2010 (J. J. Ramos Encalado).

VERDERÓN COMÚN*Carduelis chloris*

Canarias. En La Gomera, el 24 de septiembre de 2010 en las proximidades de la presa de Mulagua, Hermigua, se detecta un macho, y otro en el caserío de El Cedro, en el mismo municipio (D. Trujillo y D. García). En La Palma, datos de

presencia en localidades donde ya venía detectándose previamente: en el área recreativa de la Laguna de Barlovento se detectan cinco machos cantando el 2 de mayo de 2008, así como un ave el 12 de octubre de 2010; en zona de monte-verde y huertas de Santa Lucía, Puntallana, se detectan ocho aves el 5 de agosto de 2010 (D. Trujillo).

JILGUERO*Carduelis carduelis*

Canarias. Dato de cría en Gran Canaria: el 11 de marzo de 2010 en zona de cumbre cerca de llanos de la Pez, Tejeda, a 1.663 m de altitud –lo que sería cota máxima conocida para la nidificación de esta especie en las islas–, se detecta un ejemplar construyendo un nido en una rama de un pino canario (*Pinus canariensis*) a unos siete metros de altura. El 24 de mayo de ese año cerca de donde se obtuvo el dato anterior se observan tres o cuatro pollos volanderos que son cebados por un adulto (D. Trujillo).

ESCRIBANO NIVAL*Plectrophenax nivalis*

En Asturias, un individuo joven en Villaviciosa, el 5 de noviembre de 2010 (A. Villaverde) y uno en Gozón, el 6 de octubre de 2010 (R. Fernández y M. T. Reigada). En Bareyo, Cantabria: dos aves el día 11 y tres aves entre el 12 y el 29 de noviembre de 2010 (A. Ruiz Elejalde). Un ejemplar en Oncala, Soria, el 8 de diciembre de 2010 (F. Flechoso). Dos aves en Peñalara, Madrid, el 16 de diciembre de 2010 (F. J. Delgado). Uno en el delta del Ebro, Tarragona, el 14 de diciembre de 2010 (R. Gutiérrez). Un macho en Santa María de Besora, Barcelona, el 18 de diciembre de 2010 (J. Cervera). Tres ejemplares en Espinosa de los Monteros, Burgos, el 16 de enero de 2011 (A. F. Gil y J. A. Torre). Un macho en Cardaño de Arriba, Palencia, el 1 de febrero de 2011 (A. Rodríguez). Una hembra en Villafáfila, Zamora, el 12 de febrero de 2011 (M. Fernández Pajuelo). Un ejemplar en La Covatilla, Salamanca, los días 19 (J. L. Rivero) y 23 de marzo de 2011 (R. Montero).

BIBLIOGRAFÍA

- CARDIEL, I. E. 2006. *El milano real en España. II Censo Nacional (2004)*. SEO/BirdLife. Madrid.
- LORENZO, M. y PLANELLES, P. 2010. *La agachadiza común en España. Población reproductora en 2009 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

AGRADECIMIENTOS.—Un agradecimiento especial a todos los colaboradores que envían sus observaciones, así como a Sergio Mayordomo por su labor de recopilación de la mayoría de los registros de Extremadura, y a Nacho Dies y Ricard Gutiérrez, del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, por el envío de algunas citas. Gracias a Agustín Carretero (SEO/BirdLife) por sus labores de revisión de texto.