

Noticiario Ornitológico

Authors: Molina, Blas, Prieta, Javier, Lorenzo, Juan Antonio, and López-Jurado, Carlos

Source: Ardeola, 59(2) : 413-453

Published By: Spanish Society of Ornithology

URL: <https://doi.org/10.13157/arla.59.2.2012.413>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Blas MOLINA¹, Javier PRIETA², Juan Antonio LORENZO³ (Canarias)
y Carlos LÓPEZ-JURADO⁴ (Baleares)

Este informe agrupa información de 176 especies, siguiendo la secuencia taxonómica y los nombres de la nueva edición de la *Lista de las Aves de España* (Gutiérrez *et al.*, 2012). En esta ocasión, el conjunto de citas recopiladas se reparten por toda la geografía nacional. Algunas se refieren a nidificantes que amplían su rango de distribución o son resultado de censos detallados en algunas comunidades y provincias, aunque la mayor parte tiene que ver con especies migratorias detectadas a su paso por la península Ibérica, por las islas Baleares o en las islas Canarias, archipiélago donde hubo un excepcional paso prenupcial advertido en los meses de marzo y abril de 2012. Se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.

ÁNSAR COMÚN

Anser anser

En los humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, en 2012: se reproduce una pareja en la balsa de Arkaut, que seguramente corresponde a la primera reproducción natural en el País Vasco; el 18 de abril se observa por primera vez a la pareja con seis pollos, de los que llegan a volar cinco. No hay ningún indicio de que los ejemplares reproductores no fueran silvestres (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo).

BARNACLA CARINEGRA

Branta bernicla

Una pareja en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 19 de diciembre de 2011 (J. M. García Gutiérrez).

GANSO DEL NILO

Alopochen aegyptiacus

Un ejemplar en la ría de Bilbao, a la altura del mercado de la Ribera, Vizcaya, el 13 de mayo de

2012 (J. C. Antón Rollán). Reproducción en el embalse de La Serena, Badajoz, en 2012: el 12 de junio se observan siete parejas, una de ellas con ocho pollos; el 18 de junio se ven cuatro parejas, una con nueve pollos (Á. Sánchez, D. Rivera y otros). Cuatro ejemplares en el embalse de Los Canchales, Badajoz, el 19 de agosto de 2012 (E. Costillo). Hasta 12 ejemplares en el embalse de Cubilar, Logrosán, Cáceres, el 23 de septiembre de 2012 (E. Peña).

TARRO CANELO

Tadorna ferruginea

Seis aves en la balsa de Echavarri Viña, Álava, el 4 de junio de 2012 (C. Tejado y M. E. Potes).

Baleares. Dos ejemplares, posiblemente hembras, en el humedal de Sant Jordi, Palma, el 31 de marzo, y dos ejemplares, uno de ellos posiblemente juvenil, el 2 de octubre de 2011 (M. Rebassa/AOB). Primeras citas para Formentera: dos aves el 9 y 10 de julio de 2011 en la laguna litoral del Estany Pudent (B. Klahr y U. Meyer/AOB).

Canarias. Cría con éxito en Lanzarote: en las salinas de Janubio, Yaiza, un ejemplar el 27 de mar-

¹ noticiario@seo.org

² javierprieta@gmail.com

³ jalorenzo@seo.org

⁴ ornitologia@gobmallorca.com

zo de 2012 (F. J. García Vargas), y cuatro adultos, dos de ellos acompañados por ocho pollos de pocos días de edad, el 7 de abril de 2012 (F. J. García Vargas), todos los pollos se constata que aún sobreviven en una nueva visita efectuada tres semanas después (A. Unquiles Cobos). Otras citas de estas mismas aves se refieren a la pareja presente en las salinas el 4 de abril de 2012 (R. Burton), y la misma pareja con los ocho pollos los días 13, 14 y 17 de abril de 2012 (G. Tejera y F. Rodríguez). En Tenerife, en charca de riego entre San Isidro y El Médano, Granadilla de Abona, una pareja de adultos el 7 de abril de 2012 (N. Trujillo), aunque la semana antes ya estaba el macho (V. Cardoso).

TARRO BLANCO

Tadorna tadorna

Observaciones en los humedales de Salburúa, Victoria, Álava, en 2011: un ejemplar, seguramente el mismo, permanece en la zona desde el 1 de octubre al 24 de diciembre de 2011, si bien el 10 de noviembre se avistan siete aves (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo). Reproducción por se-

gundo año consecutivo en Extremadura: en el embalse de Valdecañas, Cáceres, se observan 12 adultos y 20 pollos el 17 de junio de 2012 (J. Prieta, S. Mayordomo y C. Clemente), 18 adultos y 39 pollos el 26 de junio (Á. Sánchez, M. Flores y J. A. Guerrero) y 24 ejemplares, en su mayoría juveniles, el 21 de julio de 2012 (S. Mayordomo).

ÁNADE FRISO

Anas strepera

Baleares. Dos adultos y cuatro jóvenes del año en la albufera de Grau, Maó, Menorca, el 12 de julio de 2011, corresponde a la segunda cita de cría, pues anteriormente ya lo había hecho en 2009 (X. Méndez/AOB). Y nueva localidad de cría con la observación en Menorca: un adulto y tres jóvenes del año el 20 de julio de 2011 en Son Saura, Es Mercadal (X. Méndez/AOB).

Canarias. En Tenerife, ampliación de fechas de estancia del macho presente en la charca de Armeñime, Adeje (véase *Ardeola*, 59: 169), viéndose nuevamente en este sitio el 25 de marzo de 2012 (V. R. Cerdeña, R. Barone, J. Vizcaíno y M. Fernández del Castillo).



Tarro canelo *Tadorna ferruginea*. Yaiza (Lanzarote). Foto: Gustavo Tejera.

CERCETA COMÚN*Anas crecca*

Canarias. En La Palma, citas en fecha estival: en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, dos machos y una hembra el 17 de junio de 2012, así como un macho el 30 de junio y el 2 de julio de 2012 (R. Burton).

CUCHARA COMÚN*Anas clypeata*

Canarias. Segunda observación en El Hierro: una hembra los días 22 y 23 de marzo de 2012 en la balsa de Frontera (D. Trujillo).

PATO COLORADO*Netta rufina*

Una pareja con nueve pollos en una gravera del río Guadiana, Badajoz, el 23 de mayo de 2012 (J. P. Prieto). Se cuentan 130 ejemplares, incluyendo hembras con pollos, en el Parque Regional del Sureste, Madrid, el 12 de julio de 2012 (M. Martínez).

Baleares. En Menorca, nueva localidad de cría con la observación de una hembra con cinco jóvenes del año el 12 de julio de 2011 en la albufera del Grau, Maó (X. Méndez/AOB).

PORRÓN EUROPEO*Aythya ferina*

Canarias. En Lanzarote, primera cita: hembra en estanque del campo de golf de Tías el 25 de marzo de 2012 (D. Pérez, F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos), prolongando su estancia hasta el 27 de marzo de 2012 (F. J. García Vargas).

PORRÓN PARDO*Aythya nyroca*

En la balsa de riego del Soto Mozanaque, Algete, Madrid, una hembra el 9 y 23 de octubre de 2011 (D. González y M. Juan) y de nuevo una hembra el 14 de octubre de 2012 (M. Juan). En El Manantío-Atalaya, Aldea del Cano, Cáceres, la especie está presente de modo continuo entre abril y septiembre de 2012, con un mínimo de un macho y un máximo de cinco ejemplares, cuatro de ellos



Porrón pardo *Aythya nyroca*. Salar de los Carros, Vera (Almería). Foto: Alejandro Aparicio.

machos, el 16 de septiembre de 2012 (SEO-Cáceres). Cuatro ejemplares en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 26 de agosto de 2012 (S. Mayordomo, C. Clemente y E. Palacios). Un macho y una hembra en el embalse de Cancelada, Estepona, Málaga, el 13 de agosto de 2012; en días posteriores solo se observa el macho hasta el 4 de septiembre (J. Caracuel).

Baleares. En Menorca, destacada invernada con seis aves el 6 de enero y 14 el 9 de febrero de 2011, además se pudo observar un ejemplar durante todo el verano a partir del 12 de julio de 2011, en Son Saura, Es Mercadal, donde cada año su presencia es más regular (X. Méndez/AOB). Se observa una pareja en la primavera de 2011 en la albufera del Grau, Maó, Menorca, con claros indicios de intento de cría, con pautas nupciales, cópulas, territorialidad, vistos hasta el 29 de junio de 2011 (X. Méndez/AOB). Y en la misma localidad, un ejemplar el 28 de noviembre de 2011 (X. Méndez y J. Florit/AOB).

PORRÓN MOÑUDO

Aythya fuligula

En el embalse de Sierra Brava, Zorita, Cáceres, donde se conocen casos de reproducción previa: una pareja el 8 de mayo de 2012 y un macho y dos hembras el 13 de mayo (M. Kelsey). Un macho en el Parque Regional del Sureste, Madrid, el 12 de julio de 2012 (M. Martínez).

NEGRÓN COMÚN

Melanitta nigra

Segundo registro en Extremadura: un macho en el embalse de la Peña del Águila, Alburquerque, Badajoz, el 8 de abril de 2012 (A. Puente, L. Puente y A. Melero).

SERRETA MEDIANA

Mergus serrator

Observaciones en la provincia de Málaga en 2011: un ave en la punta del Bombo, Mijas, el 31 de enero (J. Fregenal), uno en la zona costera de Torremuelle, Benalmádena, el 2 de febrero (J. Fregenal); uno en punta de Calaburras, Mijas, el 16 de febrero (P. van Munster y F. Ríos) y de nuevo el 21 de febrero (F. Ríos, F. Villalobos y S. Corrales).

MALVASÍA CABECIBLANCA

Oxyura leucocephala

Dos individuos jóvenes en la balsa de riego de Soto Mozanaque, Algete, Madrid, los días 20 y 24 de octubre de 2012 (M. Juan).

COLIMBO CHICO

Gavia stellata

Un ejemplar en el interior del puerto de Fuengirola, Málaga, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011 (J. A. Gallardo y R. Moreno).

SOMORMUJO LAVANCO

Podiceps cristatus

Concentraciones en Extremadura en el año 2012: 700 ejemplares el 26 de agosto en el embalse de Sierra Brava, Zorita, Cáceres (C. Clemente, E. Palacios y S. Mayordomo); 630 ejemplares el 5 de agosto en el embalse de Alange, Badajoz (Á. Sánchez); 411 ejemplares el 7 de septiembre en el embalse de Villalba de los Barros, Badajoz (F. Montañón); y 350 aves el 22 de septiembre en el embalse de Valdecañas, Cáceres (S. Mayordomo).

Baleares. En Menorca, por segundo año consecutivo vuelve a criar en la albufera del Grau, Maó, en esta ocasión con tres parejas con éxito, a diferencia del año anterior que tan solo fue de una pareja. Así, se observó la primera pareja con tres pollos y dos nidos con un adulto incubando el 30 de abril de 2011 (X. Méndez/AOB).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO

Podiceps nigricollis

Canarias. En Tenerife, el 30 de agosto de 2012, en la balsa de La Florida, Icod de Los Vinos, se observa un adulto en plumaje de transición, y de nuevo allí el 29 de septiembre de 2012 en plumaje invernal (D. Trujillo).

PARDELA CAPIROTADA

Puffinus gravis

Corrección: la fecha correcta de la cita publicada en *Ardeola*, 59: 172 de un individuo orillado en Cádiz es el 5 de noviembre de 2011.

PARDELA PICHONETA*Puffinus puffinus*

Canarias. En Lanzarote, y vistas desde La Santa, Tinajo, dos ejemplares volando con dirección norte el 7 de marzo de 2012 (J. Sagardía).

PARDELA MEDITERRÁNEA*Puffinus yelkouan*

Baleares. En Mallorca, 12 ejemplares en un grupo compacto, vuelan cerca de la costa en el cabo Enderrocat, Llucmajor, el 8 de enero de 2011 (M. McMinn/AOB). Un ejemplar en una balsa con 20 *Puffinus mauretanicus* en cala Rajada, Capdepera, el 20 de enero de 2011 (L. Ventoso y A. Muñoz/AOB). En Sa Dragonera, un grupo de cinco ejemplares el 25 de enero de 2011 (M. McMinn/AOB).

PAÍÑO BOREAL*Oceanodroma leucorhoa*

Canarias. Corrección: la fecha correspondiente a la cita publicada en *Ardeola*, 59: 172 de un individuo recogido en la isla del Hierro es el 17 de noviembre de 2011.

ALCATRAZ ATLÁNTICO*Morus bassanus*

Canarias. Citas de paso prenupcial: en Lanzarote, en aguas frente a Arrecife, tres el 10 de febrero de 2012 y más de 100 ejemplares el 30 de marzo de 2012 y de nuevo más de 100 aves el 16 de abril de 2012 (F. J. García Vargas). Desde el litoral de La Santa, Tinajo, alrededor de 40 ejemplares vistos en paso el 7 de marzo de 2012 (J. Sagardía) y dos aves el 3 de abril de 2012 (F. J. García Vargas), así como uno en Puerto del Carmen, Tías, el 2 de abril de 2012 (F. J. García Vargas). En esta misma isla, un adulto muerto el 12 de marzo de 2012 en la playa del Cochino, Tinajo, así como un grupo de 10, cinco adultos y cinco juveniles, el 28 de marzo de 2012 a dos millas de playa Quemada, Yaiza (G. Tejera). En Fuerteventura, en la playa de Sotavento, en Jandía, Pájara, paso de al menos tres grupos, con diez, siete y nueve aves, respectivamente, la mañana del 5 de abril de 2012 (J. A. Lorenzo). En



Alcatraz atlántico *Morus bassanus*. Aguas frente a Mogán (Gran Canaria). Foto: Vicente Morales.

aguas entre Tenerife y Gran Canaria, varios grupos de entre 5 y 7 aves cada uno, en vuelo con dirección norte, el 25 de febrero de 2012 (M. Carrillo Pérez). Otros avistamientos de adultos se efectúan en Gran Canaria, en concreto en aguas frente a Puerto Rico, Mogán, el 25 de febrero de 2012 (V. Morales).

CORMORÁN GRANDE*Phalacrocorax carbo*

Intento de cría de una pareja en el P. N. del Delta del Ebro en la temporada 2011: instala el nido en un taray observándose un pollo y un huevo, pero finalmente lo abandonan (D. Bigas). En la temporada 2012 se han censado 651 nidos ocupados en tres colonias en Extremadura, todas en la provincias de Badajoz. La mayor parte, 619 parejas, se localizan en dos núcleos del embalse de La Serena; además se han detectado dos nuevas colonias, una en el embalse de Alange con 23 nidos ocupados y otra en el embalse de Alqueva con nueve nidos (Á. Sánchez, D. Rivea, L. R. Hernández, J. C. Paniagua y otros). Colonia con al menos 35 nidos ocupados en la gravera de El Puente, Seseña, Toledo, instalada en una colonia de garcilla bueyera y martinete, en junio de 2012 (B. Molina). Alrededor de 700 aves en una decena de grupos volando en dirección sur sobre el río Ebro, en Alfaro, La Rioja, el 10 de septiembre de 2012 (J. Ucha).



Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*. Embalse de La Serena (Badajoz). Foto: Ángel Sánchez.

CORMORÁN MOÑUDO

Phalacrocorax aristotelis

Baleares. En la isla de Sa Conillera, Sant Josep, Eivissa, se confirma la nidificación después de 15 años de ausencia con la observación de dos parejas el 30 de enero de 2011 (O. Martínez/AOB).

AVETORO COMÚN

Botaurus stellaris

En Salburúa, Vitoria, Álava, en 2012: un ave se levanta del carrizal de la balsa de Duranzarra el 24 de febrero y otra del espadañal en la balsa de Arkaute, el 11 de mayo (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo). Un ejemplar en Astigarraga, Guipúzcoa, el 16 de mayo de 2012 (M. Alfonso). Dos ejemplares en la laguna de Pétrola, Albacete, el 24 de mayo de 2012 (R. Torralba). Segunda cita de reproducción en Extremadura: en el embalse de Arrocampo, Cáceres, se observa un adulto acompañado de dos juveniles el 7 de julio

de 2012 (S. Mayordomo), además se avistó previamente un ejemplar los días 12 de abril (A. Redondo), 22 de abril (S. Mayordomo y E. Palacios), 17 de mayo (M. García del Rey), 28 de mayo (M. García del Rey, E. Pérez-Balsalobre y E. Fernández-Larreta) y 2 de septiembre (M. Carregal y G. Fernández).

AVETORILLO COMÚN

Ixobrychus minutus

Observación invernal: un macho en la desembocadura del río Guadalhorce, Málaga, el 28 de noviembre de 2010 (J. A. Maldonado y A. Molina). **Baleares.** Se comprueba por primera vez la cría en Menorca: una pareja y dos pollos en Son Saura, Es Mercadal, el 20 de julio de 2011 (X. Méndez y J. Florit/AOB).

Canarias. En La Palma, donde hay pocas citas: en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, una hembra el 31 de marzo de 2012 y un ejemplar los días 9, 17 y 24 de abril de 2012 (R. Burton).

MARTINETE COMÚN*Nycticorax nycticorax*

Canarias. Citas de paso prenupcial en 2012. En Lanzarote, uno sobrevolando el Puerto del Carmen, Tías, el 7 de marzo (F. J. García Vargas), otro en el campo de golf de Tegui el 9 de marzo (J. Sagardía) y, por último, otro en el campo de golf de Tías el 11 de marzo (F. J. García Vargas y J. Sagardía); un juvenil el 13 de marzo en la planta depuradora de Arrecife y otro juvenil sobrevolando las Salinas de Janubio, Yaiza, el 21 de marzo, así como un adulto el 24 de marzo en la Marina de Arrecife (G. Tejera). En Fuerteventura, uno semioculto en tarajales en El Tarajalillo, Tuineje, el 10 de marzo, y tres (dos adultos y un inmaduro) en los pantanales del muelle deportivo de Gran Tarajal, Tuineje, el 24 de marzo (M. Cabrera). En Tenerife, el 7 de abril se observó un total de 38 ejemplares en dos charcas de riego de Tejina y Bajamar, La Laguna, de las que salieron al atardecer, respectivamente, 29 y 9 aves, en su mayoría adultas y subadultas, con un mínimo de cuatro juveniles. Esta cifra, muy superior a la quincena de efectivos residentes en la zona, cabe atribuirla a la arribada de efectivos de paso coincidiendo con días de intensa migración (V. R. Cerdeña, J. Vizcaino, R. Barone y M. Fernández del Castillo). En La Palma, distintas observaciones en sendas charcas de riego en Cabrejas y La Costa, Tazacorte: uno en vuelo el 29 de febrero, uno el 31 de marzo, entre una y dos aves los días 9, 12, 14, 17, 22 y 28 de abril, un macho los días 6 y 29 de mayo, los días 2 y 4 de junio, y luego en otra charca el 22 de junio, así como dos machos el 26 de junio, y, por último, un macho el 16 y de nuevo el 26 de julio (R. Burton).

GARCILLA CANGREJERA*Ardeola ralloides*

Dos parejas en la laguna de Pétrola, Albacete, en mayo de 2012 (R. Torralba). Se observan 19 individuos en el río Gadiana, Badajoz capital, el 9 de septiembre de 2012 (J. C. Paniagua).

Canarias. En Fuerteventura, dos en el embalse de los Molinos, Puerto del Rosario, el 11 de marzo de 2012 y una en Pozo de Esquinzo, La Oliva, el 12 de marzo de 2012 (M. Cabrera). En La Gome-

ra, segunda observación: el 26 de abril de 2012 en la presa de Antoncojo, Alajeró, se observa un adulto en plumaje nupcial (D. Trujillo). En La Palma, en sendas charcas de riego en Cabrejas y La Costa, Tazacorte, dos aves el día 28 de abril y una el día 30 de abril de 2012, así como una el día 6 de mayo de 2012 (R. Burton).

GARCILLA BUEYERA*Bubulcus ibis*

Baleares. Nueva localidad de cría en Menorca: se localizan 12 nidos en Lluriac, Es Mercadal (X. Méndez y R. Escandell/AOB) y 48 ejemplares entre adultos y pollos, el 26 de junio de 2011 (D. Coll/AOB).

Canarias. En Tenerife, dos aves alimentándose en el césped de una rotonda de acceso a Adeje el 29 de julio de 2012 (J.-G. Le Roux). En La Palma, continuando con las citas invernales previas (véase *Ardeola*, 59: 174), en torno a 2 y 6 aves a lo largo de todo el mes de marzo de 2012 en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, alcanzando un máximo de 10 aves el día 10 de dicho mes, mientras que el siguiente mes se cuentan ocho ejemplares el día 9 de abril, 4 aves el 12 de abril y sólo una los días 14, 17, y 22 de abril de 2012 (R. Burton). En ese mismo lugar, un ave el 20 de septiembre de 2012 (R. Burton).

GARCETA GRANDE*Egretta alba*

Un ave en el valle del Guadalhorce, Málaga, el 7 de enero de 2010 (J. I. Álvarez) y entre dos y tres aves el 9 de enero de 2010 (A. J. Plaza). En los humedales de Salburúa desde octubre de 2011 a julio de 2012: se observan individuos de forma permanente, normalmente en número reducido, una o dos aves; aunque la especie parece haberse convertido en residente en la zona, no se han observado indicios reproductores (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo). Observaciones destacadas en el ámbito del Parque Natural de la Albufera de Valencia: máximo invernal registrado hasta la fecha, hasta 190 ejemplares censados el 13 de enero de 2012 (OGT Parc Natural, SEO/BirdLife y Servicio Devesa-Albufera); bando destacado de 84 aves al atardecer sobre la R. N. del Tancat

de Milia, Sollana, dirección noreste el 24 de enero de 2012 (T. Alcocer); al menos 127 aves en zonas inundadas entre el tancat de Naia, Catarroja, y El Filero, Silla, el 29 de febrero de 2012 (B. Dies); al menos 123 aves en zonas inundadas de los tancats de Naia y dels Pescadors, Catarroja, el 10 de marzo de 2012 (B. Dies) y hasta 87 individuos en zonas inundadas de El Malvinar, Sueca, el 18 de octubre de 2012 (J. Herzer y B. Dies). Cinco ejemplares con plumaje nupcial en el embalse de Arrocampo, Cáceres, entre el 15 y el 29 de abril de 2012; también se observa el aporte de material para el nido. Es el tercer año que la especie cría en esta localidad (SEO-Cáceres). Un ejemplar en época estival en la provincia de León, en la laguna de Sentiz, Valdepolo, León, el 26 de julio de 2012 (T. Sanz), permaneciendo hasta el 18 de agosto de 2012 (J. Á. Arriola).

GARZA IMPERIAL

Ardea purpurea

Un ejemplar joven a la salida del Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 24 de diciembre de 2010 (A. Serrano). Observado un grupo familiar formado por los dos adultos y dos juveniles junto a una zona de carrizales en el río Esla junto al llamado Puente Quintos, Tábara, Zamora, área aparentemente apropiada para la reproducción de la especie, el 17 de agosto de 2012 (T. Sanz, J. Á. Arriola, M. Novo, J. D. Hernández y B. Durán).

Canarias. Citas del paso prenupcial en 2012. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, una el 7 de marzo (J. Sagardía), otra el 15 de marzo (F. J. García Vargas) y de nuevo allí otra del 24 al 30 de abril (F. J. García Vargas y J. Sagardía); en el campo de golf de Tegui, una el 15 de marzo y dos aves el 21 de abril (F. J. García Vargas), quedándose una de ellas hasta el 28 de abril (F. J. García Vargas, A. Unquiles Cobos y J. Sagardía); aves solitarias en el aeropuerto de Guacimeta, Tías, el 13 de marzo (J. Sagardía), en Janubio, Yaiza, el 27 de marzo (F. J. García Vargas) y finalmente sobrevolando Montaña Blanca, San Bartolomé, el 5 de abril (J. Sagardía). En Fuerteventura, en el Barranco de la Torre, Antigua, dos aves el 9 de marzo (M. Cabrera) y un ejemplar adulto los días 3 y 4 de abril (V. R. Cerdeña) así como en Los

Alares, posiblemente el mismo, el 8 de abril (J. A. Lorenzo). En esta misma isla, una en vuelo por el Barranco de Vinámar, Pájara, y otra posada descansando en El Tarajalillo, Tuineje, el 10 de marzo (M. Cabrera).

CIGÜENA NEGRA

Ciconia nigra

Seis aves (dos jóvenes, tres adultas y una de edad desconocida) en el valle del Guadalhorce, Málaga, el 27 de diciembre de 2010 (J. Ripoll, D. J. Plaza y A. J. Plaza). Concentraciones en paso post-nupcial 2012 en Extremadura: 109 ejemplares en una charca de Trujillo, Cáceres, el 9 de septiembre (J. Esteban) y 61 aves en el embalse de Alange, Badajoz, el 13 de septiembre (Á. Sánchez). Unas 18 aves en migración al sur sobre el río Gormaz, Soria, el 24 de septiembre de 2012 (J. J. Rubio). Datos de la población andaluza invernante: durante el invierno de 2006/2007 se contaron 347 individuos: en Cádiz se censaron 38 individuos, 2 en Córdoba, 26 en Málaga y 281 en Sevilla; en el invierno de 2007/2008 invernaron 266 ejemplares, de las cuales 38 se localizaron en Cádiz, 3 en Córdoba, 8 en Huelva, 7 en Málaga y 210 en Sevilla; en el invierno 2009-2010 el censo realizado dio un total de 178 individuos repartidos en cuatro provincias: 34 en Cádiz, 2 en Huelva, 10 en Málaga, y 132 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía) y, por último, en 2010/2011 el censo fue de 157 individuos, concentrados en torno a 8 dormitorios o lugares de asentamiento principales, alguno de ellos bastante laxo, así en Cádiz se encontraron 32 individuos (20,4%) en 3 dormitorios; en Huelva 4 (2,5%) en 2 dormitorios; 9 individuos (5,7%) en 1 dormitorio en Málaga; y en Sevilla 112 (71,3%) en 2 dormitorios (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Por otra parte, en Andalucía en 2006 la población reproductora fue de 51 parejas, repartidas como sigue: 9 en Córdoba, 18 en Huelva, 6 en Jaén y 18 en Sevilla, y en 2009 fue de 87 parejas reproductoras (más 2 probables), todas en Sierra Morena. Se censaron 16 en Córdoba, 33 en Huelva, 9 en Jaén –donde se situaron las 2 probables–, y 29 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

CIGÜEÑA BLANCA*Ciconia ciconia*

Canarias. En Lanzarote, en 2012, una en Arrecife el 9 de abril (F. J. García Vargas) y probablemente la misma cerca del campo de golf de Tías el 10 de abril (J. Sagardía). En Fuerteventura, en 2012, tres aves posadas sobre apoyo de tendido eléctrico de distribución en el pueblo de Tiscamanita, Tuineje, el 12 de abril (M. Cabrera), y de nuevo tres, muy posiblemente las mismas, en el vertedero insular, Puerto del Rosario, el 20 de abril (V. R. Cerdeña).

MORITO COMÚN*Plegadis falcinellus*

Nuevas localidades de reproducción y observaciones fuera del área habitual de distribución. En Andalucía nuevos humedales de cría en 2012: en la isla de la laguna de la Fuente del Rey, Dos Hermanas, Sevilla, donde se ha reproducido por primera vez instalándose en un garcero preexistente. Dada la sequía imperante en Andalucía occidental durante toda la estación de cría, la numerosa población reproductora del Parque Nacional de

Doñana (Máñez y Rendón-Martos, 2009) ha buscado otras áreas favorables, como esta laguna, situada cerca de las marismas del Guadalquivir. Se empezaron a ver ejemplares adultos a finales de enero utilizando la isla como dormitorio y su número fue incrementándose progresivamente. En marzo la presencia en el garcero era permanente, y se registraba una gran actividad en la construcción de nidos. A finales de abril se detectaron las primeras puestas. Se estima que nidificaron un mínimo de 250 parejas (sobre tarajes y álamos, aunque también sobre dos pequeños acebuches, una morera y una acacia), habiendo volado varios centenares de pollos. Posteriormente, utilizaron la zona como dormitorio hasta mediados de septiembre. (M. Hernández, M. Máñez, A. Martínez y R. Rodríguez). Una segunda localidad corresponde al humedal catalogado El Pantano, Los Palacios y Villafranca, Sevilla, donde la especie se ha reproducido por primera vez asociándose a garzas imperiales que suelen criar en esta localidad. Las aves utilizaron la zona todo el año como dormitorio, oscilando el número de ejemplares entre 50 y 200. A partir de principios de marzo se observa actividad reproductora, produciéndose las primeras puestas a mediados del mismo mes. Se estima



Morito común *Plegadis falcinellus*. Dos Hermanas (Sevilla). Foto: Rubén Rodríguez Olivares.

que nidificaron un mínimo de 35 parejas con al menos 85 pollos observados. El sustrato de nidificación fue enea *Typha* sp. Las aves han seguido utilizando la zona como dormitorio (J. Ayala y J. L. Arroyo). Una tercera localidad fue la Gravera de Adventus, Trebujena, Cádiz, donde se reproduce por primera vez 2011 en una garcera que también acoge martinetes, garcetas comunes, garcillas bueyeras y garcillas cangrejeras. La colonia se asentó sobre tarajes *Tamarix* sp. En abril de 2011 se observó alrededor de un centenar de individuos en la colonia, de los que finalmente realizan la cría con éxito unas 5 parejas. En mayo se observaron pollos grandes y a mediados de junio aún había una pareja incubando y se estimaron unos 15 pollos volados al final de la reproducción (J. L. Arroyo). Posteriormente en 2012, a mediados de mayo se observan unas 30 parejas empezando la incubación. A mediados de junio se observan 15 pollos medianos, que siguen en la colonia en julio, junto con unos 50 adultos. Sin embargo, el éxito reproductor resultó bastante bajo debido a la sequía reinante en la zona (J. L. Arroyo). En la antigua laguna de la Janda, Cádiz, se observan seis aves construyendo nidos el 20 de mayo de 2012 (F. J. Navarro Quirós/COCN). Varias parejas se instalan en la garcera del P. N. Tablas de Daimiel, Ciudad Real, en la temporada de cría 2011, consiguiendo una de ellas criar con éxito un pollo (P. N. Tablas de Daimiel). Primer caso de reproducción en Extremadura, año 2012: en la colonia de ardeidas del Azud del Guadiana, Badajoz, al menos 9 parejas de las que dos crían con éxito 3 y 2 pollos. El 15 de abril se observan dos aves; los días 18 y 20 de abril se cuentan 16 individuos y se localizan dos nidos; a finales de mayo se ven al menos nueve ejemplares incubando; el 15 de junio sólo se ve un morito en la colonia; el 29 de junio se detecta un adulto cebando a tres pollos; y los días 21 y 22 de julio se ven cinco pollos. A lo largo de la temporada se observaron cuatro aves anilladas, todas ellas nacidas en Doñana (J. C. Paniagua y A. Fernández). Observaciones fuera del área habitual. En Asturias, hasta 20 ejemplares en Gijón el 29 de marzo de 2012 (J. Menéndez), unos 20 individuos en el embalse de La Granda, Gozón, el 4 de abril de 2012 (M. Fernández Revuelta) y 67 aves en el parque fluvial de Gijón, el día 8 y 31 aves el 14 de abril de 2012

(A. Vigil). En Cantabria se cuentan 46 aves en Oyambre, San Vicente de la Barquera, el 1 de abril de 2012 (B. Diez Rioz), 30 ejemplares en un dormitorio de Torrelavega, y 47 ejemplares en la costa oeste cántabra durante el mes de marzo de 2012 (A. García Herrera) y 67 aves en Argoños, Santoña, el 8 de abril de 2012 (J. Colás). Observaciones en los humedales de Salburúa, Álava, en 2011: 21 aves el 2 de octubre de 2011 y 2 individuos desde el 3 hasta el 9 de octubre (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo). Uno en prados húmedos junto al río Zapardiel, Medina del Campo, Valladolid, el 11 de mayo y de nuevo el 7 de junio de 2012 (C. Velázquez). Dos aves, un adulto y un juvenil en río Grande, Cártama, Málaga, el 30 de mayo de 2012 (A. Garrucho y M. Rivera) y el adulto fue avistado posteriormente en la colonia de ardeidos de la laguna de Los Prados, Málaga capital (J. A. Cortés), donde ya se habían observado aves en días previos. Máximo registrado hasta la fecha en la albufera de Valencia con cerca de 600 aves sobrevolando en un único bando la R. N. del Tancat de Milia, Sollana, de las que unas 320 se paran a descansar en una de las lagunas de la reserva, el 19 de septiembre de 2012 (C. Varea y T. Alcocer). En Extremadura la presencia de moritos ha sido constante en algunos puntos cercanos al río Guadiana en Badajoz durante el verano de 2012; los máximos detectados son de 24 aves en Mérida el 31 de mayo (Á. Sánchez), 22 ejemplares en Guadiana del Caudillo el 24 de septiembre (P. Herrador), 21 individuos en arrozales del Gévora, Badajoz, el 18 de agosto (A. Fernández), 20 aves en el embalse de Los Canchales el 1 de septiembre (V. de Alba, A. Núñez y F. Montaña), 20 individuos en el embalse de Montijo, Mérida, el 26 de septiembre (J. Solana) y 19 aves en regadíos de Montijo el 19 de agosto (Á. Sánchez y P. Herrador). Un adulto en Ciempozuelos, Madrid, el 29 de agosto de 2012 (C. Talabante y A. Aparicio).

ESPÁTULA COMÚN

Platalea leucorodia

Intento de reproducción en las marisma del río Palmones, Cádiz, en 2012: en este humedal se realizaron 18 observaciones entre el 11 de enero de 2011 y el 22 de mayo de 2012 desde uno a siete individuos y es en esta fecha cuando se confirma

la nidificación con observaciones de adultos portando ramitas y construcción de nido (I. Epelde, P. Fragio, F. J. Navarro Quiros, A. M. de la Vega y F. Montoya/COCN). Reproducción en Extremadura, temporada 2012: se han censado 49 parejas nidificantes en seis localidades, cuatro de la provincia de Cáceres (dos en el valle del Tiétar con 18 y 15 parejas, una en el valle del Alagón con dos parejas y el embalse de Arrocampo con una pareja) y dos en la provincia de Badajoz (embalse de Montijo con 12 parejas y Villanueva del Fresno con una pareja) (J. Prieta, S. Mayordomo, E. Costillo y A. Pérez del Barco). Primera reproducción con éxito en el valle del Alagón, Cáceres: dos parejas con nido, una de ellas fracasa y la otra saca adelante tres pollos, ya grandes los días 12 y 26 de julio de 2012. En 2011 hubo tres parejas con nido, pero todas fracasaron (S. Mayordomo). Nueva localidad de cría en Villanueva del Fresno, Badajoz: al menos un nido de espátula es ocupado en una garcera mixta las temporadas 2011 y 2012 (A. Pérez del Barco). Dos parejas se instalan en la garcera de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, en la temporada de cría de 2011; una de ellas fracasa y la otra saca adelante tres pollos (P. N. Tablas de Daimiel).

Concentraciones en el embalse de Los Canchales, Badajoz, durante el paso otoñal de 2012: máximo en agosto de 88 aves el día 12 y en septiembre de 150 ejemplares el día 15 (SEO-Cáceres). Un juvenil en la laguna de Sentid, Valdepolo, León, el 28 septiembre del 2012 (J. Á. Arriola).

FLAMENCO COMÚN

Phoenicopterus roseus

Se comprueba la reproducción durante el año 2012 en la laguna de Pétrola, Albacete: se estima un mínimo de 831 parejas reproductoras y un mínimo de 812 pollos nacidos entre finales de mayo (primer nacimiento el día 24) y mediados de junio (último nacimiento el día 16). La especie ya se reprodujo en la laguna de Pétrola durante los años 1999 y 2000, estimándose respectivamente, 98 y 232 parejas, y volando 83 y 212 pollos (J. Picazo). Se cuentan 15 ejemplares en el embalse de Villalba de los Barros, Badajoz, los días 28 (J. Elías) y 31 de julio de 2012 (V. de Alba y A. Núñez). Dos individuos en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 1 de septiembre de 2012 (S. Mayordomo). Ocho ejemplares en el embalse del Salor, Cáceres, el 8



Flamenco común *Phoenicopterus roseus*. Laguna de Pétrola (Albacete). Foto: Juan Picazo.

de septiembre de 2012 (C. Fernández Díaz). Un juvenil en el embalse de Navalcán, Toledo, el 7 de agosto de 2012 (L. S. Cano).

Baleares. En Eivissa, un nuevo récord histórico para Baleares con la concentración de 829 ejemplares el 16 de septiembre de 2011 en las Salines, Sant Josep (O. Martínez, J. Estarella, J. C. Palerm, J. E. Cardona, J. Serapio, R. Tur, J. Calvo, D. García y B. Rodríguez/AOB).

ABEJERO EUROPEO

Pernis apivorus

En la temporada reproductora de 2011 solo se constató la existencia una pareja reproductora en Andalucía, concretamente en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Decenas de ejemplares sedimentados en cultivos de regadío del valle del Cinca, Huesca, los primeros días de septiembre de 2012 (A. T. Mejías).

ELANIO COMÚN

Elanus caeruleus

Un adulto posado en un tendido eléctrico junto a la carretera Boceguillas-Campo de San Pedro, en Grajera, Segovia, el 22 de julio, el 27 de agosto y el 12 de octubre de 2012, en una zona con campos de girasoles y cereales, cercanos a bosquetes de melojos (D. Aparicio, A. Aparicio, P. Pascual y R. Aparicio). Reproducción en Andalucía en la temporada de 2011 con un mínimo de 177 parejas seguras y 14 probables, repartidas en las siguientes provincias: 1 pareja segura en Almería; en Cádiz 65 seguras y 8 probables; 45 seguras y 2 probables en Córdoba; 5 seguras en Granada; 8 seguras y 2 probables en Huelva; en Jaén 10 seguras y 1 pareja probable; en Málaga 2 seguras y 1 probable; 41 seguras en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

MILANO NEGRO

Milvus migrans

Canarias. En Fuerteventura, en el vertedero insular, Puerto del Rosario, un ave el 20 de abril de 2012 (V. R. Cerdeña).

MILANO REAL

Milvus milvus

Datos de la población reproductora de Andalucía: en 2007 se localizaron 40 parejas repartidas en tres provincias: 1 en Cádiz y Sevilla, y 38 en Huelva; en 2008 el resultado fue de 31 parejas, circunscritas a Sevilla con 2 parejas, Cádiz con 1 y Huelva con 28, mientras que en 2009 fue de 39 parejas reproductoras, distribuidas fundamentalmente por Doñana y su entorno: 3 parejas en Cádiz, 38 en Huelva, y 2 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Datos de la población andaluza invernante: durante el invierno 2006/2007 se censaron 979 individuos invernando, repartidos entre Sevilla con 359, Huelva con 300, Cádiz con 30 y Córdoba con 290; 1.414 milanos invernantes en 2007-2008, repartidos en Cádiz con 87, Sevilla con 514, Huelva con 554 y Córdoba con 259; durante el invierno 2008/2009 se contaron 1.634 aves en un total de 26 dormitorios: 97 en Cádiz, 352 en Córdoba, 869 en Huelva y 316 en Sevilla y, finalmente, en 2009/2010 el censo fue de 1.384 individuos, repartidos en 25 dormitorios. En Cádiz se encuentran 93 individuos en 1 dormitorio; en Córdoba 365 en 5 dormitorios; en Huelva 544 en 14; en Málaga un individuo; y en Sevilla 381 en 5 dormitorios (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

Baleares. En Mallorca, durante 2011 se localizaron 19 parejas territoriales, una menos que en 2010 (20 parejas) y 4 menos que en 2009 (23 parejas). Su distribución fue muy similar a los últimos años, con el grueso de parejas dentro de los municipios de Santa María, Bunyola, Esporles, Alaró, Valldemossa, Llucmajor (una pareja) y Artà (una). Se observaron individuos reproductores con dificultades para localizar parejas, circunstancia que puede darse en poblaciones pequeñas. De las 19 parejas territoriales, 16 realizaron puesta (84%) y 13 (68%) sacaron algún pollo. Los datos de productividad experimentan una ligera recuperación respecto a la media de la última década. En total volaron 26 pollos. Además, se marcaron 10 ejemplares con emisores y 25 con anillas y marcas alares de color naranja. Tres de ellos tuvieron que ser rescatados en el momento del marcaje. En un caso, un ejemplar se quedó sin adultos (¡se

alimentaba de un hermano mientras los esperaba!) y otros dos estaban liados al nido con cuerdas y plásticos (J. Adrover/AOB).

QUEBRANTAHUESOS

Gypaetus barbatus

Un inmaduro en Los Hoyicios, Guadalupe, Cáceres, el 31 de mayo de 2012 (P. Chamorro).

ALIMOCHE COMÚN

Neophron percnopterus

Corrección: la fecha correspondiente a la cita publicada en *Ardeola*, 59: 177 sobre invernada en la provincia de Cáceres es el 11 de diciembre de 2011.

BITRE LEONADO

Gyps fulvus

Datos de la población andaluza invernante: en el invierno 2007-2008 registró una población invernal cercana a los 14.000 individuos, distribuidos por Almería con 155, unas 3.867 aves en Cádiz, 1.651 en Córdoba, 156 en Granada, 2.926 en Huelva, 2.149 en Jaén, 801 en Málaga y 2.688 en Sevilla; en el invierno 2008-2009 la población invernante arrojó la cifra de 13.500 buitres, distribuidos especialmente por Sierra Morena (53%), sierras gaditanas (32,6%) y Cordilleras Béticas (14,4%). En cuanto a provincias se localizaron 126 en Almería, 4.416 en Cádiz, 2.431 en Córdoba, 315 en Granada, 1.413 en Huelva, 1.628 en Jaén, 884 en Málaga y 2.311 en Sevilla, y, por último, en el invierno 2009/2010 la población mínima fue de 14.872 individuos, distribuidos por igual entre el Sistema Bético y Sierra Morena, distribuidos: en Almería 184, en Cádiz 4.844, en Córdoba 2.677, en Granda 320, en Huelva 1.665, en Jaén 1.685, en Málaga 1.018 y en Sevilla 2.479 (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

Baleares. Un ejemplar muerto en avanzado estado de descomposición en la isla de S'Espalmador, Formentera, el 2 de febrero de 2011, que portaba anilla metálica y de PVC correspondiente a un ejemplar anillado en el P. N. del Torcal (Málaga) en diciembre de 2010 (O. Martínez/AOB). Un

máximo de 45 ejemplares en la isla de Sa Dragonera, el 19 de marzo de 2011 (J. García-Delgado/AOB). Máximo de 45 ejemplares en Cúber, Escorca, Mallorca, el 9 de septiembre de 2011 (P. A. Garnett/AOB).

BITRE NEGRO

Aegypius monachus

Un inmaduro entre un grupo de buitres leonados, en Camín Real de la Mesa, cerca del Alto de San Lorenzo, Asturias, el 30 de julio de 2011 (J. M. Marín Calzado) y dos aves adultas también en un grupo de buitres leonados, en Masegosa, Cuenca, el 23 de julio de 2012 (M. Orobítg).

Baleares. En Mallorca, en 2011 se registró récord para la población de la sierra de Tramuntana: se localizaron 16 parejas territoriales de las cuales 13 efectuaron puesta, eclosionando 10 huevos. La climatología les benefició, ya que no llovió durante la incubación y las primeras semanas de vida, de manera que volaron todos los pollos, cifra que supera los datos de 2008 y 2009, con nueve pollos volados (J. Muntaner/AOB).

CULEBRERA EUROPEA

Circus gallicus

Un individuo invernante en el curso bajo del valle del Guadalhorce, entre Campanillas y Málaga, Málaga, desde principios de diciembre hasta, al menos, el 14 de diciembre de 2011 (I. Gómez y J. A. Cortés).

Baleares. Escasas citas en 2011: así en Mallorca, el primer ejemplar se observa el 8 de marzo en Calvià (G. Bernat/AOB); un ave los días 4 y 5 de mayo, posiblemente el mismo ejemplar, entre Albercutx y Formentor, Pollença (L. Ventoso/AOB); un inmaduro muy blanco en el llano de Lanzell, Vilafranca, Baleares, el 12 de mayo (M. Rebassa/AOB); un ave en los alrededores de María de la Salut, el 30 de agosto (M. Rebassa/AOB); uno en Sineu el 30 de septiembre (J. Sunyer/AOB); uno en el aeropuerto de Palma el 1 de octubre (S. Nicoll y J. L. Martínez/AOB); los dos últimos ejemplares fueron vistos el 9 de octubre cogiendo altura para posteriormente partir hacia Cabrera desde el cabo de Ses Salines, Santanyí (L. Ventoso y S. Quintanilla/AOB). En Menorca, en 2011,

un ave en Son Planes, Ciutadella, el 13 de mayo (Ll. Julià/AOB); un ejemplar en el llano de Lantzell, Vilafranca, Baleares, el 6 de agosto (M. Rebassa, L. Ventoso y S. Quintanilla/AOB).

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL

Circus aeruginosus

En 2012 en los humedales de Salburúa, se reproducen por segundo año consecutivo dos parejas, sacando adelante dos pollos en la balsa de Betoño y cuatro en la de Arkaute. Se trata de una especie muy escasa a escala autonómica, con 20 parejas en 2011 en todo el País Vasco (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo).

AGUILUCHO CENIZO

Circus pygargus

Datos de la población andaluza: en 2007 se localizaron 807 parejas reproductoras y se estimaron 1.009 parejas: 150 en Cádiz, 175 en Córdoba, 34 en Granada, 160 en Huelva, 170 en Jaén, 100 en Málaga y 220 en Sevilla; mientras que en 2010 el número de parejas reproductoras ascendió a 1.010, repartidas en todas las provincias menos en Almería: 171 en Cádiz; 191 en Córdoba; 23 en Granada, 131 en Huelva, 184 en Jaén, 127 en Málaga y 203 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

BUSARDO RATONERO

Buteo buteo

Baleares. En Mallorca, nueva especie nidificante en la comunidad al confirmarse la cría de una pareja con dos juveniles volanderos en Valldemossa el 30 de junio de 2011 (A. Morro/AOB).

Canarias. En Lanzarote, uno en el vertedero de Zonzamas, Tegui, el 9 de marzo de 2012 (J. Sagarbía).

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

Aquila adalberti

Dos ejemplares jóvenes en el paraje llamado Entreríos, en Mijas-Costa, desde el Mirador de las Águilas, Málaga, el 23 de septiembre de 2011 (B. López). Un ejemplar de segundo año en A Graña,

Covelo, Pontevedra, el 13 de julio de 2012 (J. S. Sío, C. Sío y R. M. Méndez).

ÁGUILA CALZADA

Aquila pennata

Canarias. Citas tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria que complementan la irrupción entre 2006 y 2007 (véase *Ardeola* 54(2) y 55(1) para más detalles): un ave de fase oscura en la Rosa de Catalina García, Tuineje, el 12 de enero de 2007, y un ejemplar de fase clara en las charcas de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de enero de 2007 (J. J. Ramos y D. Trujillo). En El Hierro, en la zona baja de Frontera, un ejemplar de fase clara el 19 de abril de 2012 (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez).

ÁGUILA PERDICERA

Aquila fasciata

El número de parejas censadas en Andalucía en 2009 fue de 334 seguras y 14 probables, repartidas en las distintas provincias: en Almería 75 seguras y 3 probables; en Cádiz 41 seguras; en Córdoba 39 y 2 probables; en Granada 54 y 3 probables; en Huelva 1 pareja segura; en Jaén 34 y 1 probable; en Málaga 72 y 5 probables; y en Sevilla 18 parejas seguras (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

ÁGUILA PESCADORA

Pandion haliaetus

En invierno 2010-2011, tras cubrir en el censo invernal de la especie el 90% de las localidades conocidas, la población de águilas pescadoras invernantes en Andalucía asciende a un mínimo de 116 individuos, encontrándose 45 en Cádiz, 38 en Huelva, 2 en Málaga y 31 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

CERNÍCALO PRIMILLA

Falco naumanni

Datos de la población reproductora en Andalucía: en 2007 se censaron 4.431 parejas reproductoras repartidas en las diferentes provincias andaluzas:

89 en Almería, 882 en Cádiz, 643 en Córdoba, 226 en Granada, 315 en Huelva, 282 en Jaén, 430 en Málaga y 1.564 en Sevilla; en 2009 fue de 4.813 parejas distribuidas de la siguiente manera: 93 en Almería, 814 en Cádiz, 739 en Córdoba, 194 en Granada, 365 en Huelva, 288 en Jaén, 450 en Málaga y 1.870 en Sevilla; y, por último, en 2011 el censo arrojó la cifra de 5.077 parejas reproductoras con presencia en todas las provincias y repartidas en 687 colonias, 407 dispersas por el medio rural (cortijos, ruinas, cortados, etc.) y 280 ubicadas en ambientes urbanos (iglesias, castillos, torreones, etc.) repartidas de la siguiente manera: en Almería se censaron 103 parejas en 24 colonias, en Cádiz 849 en 134 colonias, en Córdoba 828 en 148 colonias, en Granada 203 en 55 colonias, en Jaén 722 en 60 colonias, en Málaga 480 en 53 colonias, 1.546 en 194 colonias en Sevilla, y 346 en 19 colonias en Huelva (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Se censan 529 ejemplares en un dormitorio en la comarca de La Vera, Cáceres, el 9 de agosto de 2012 (J. Prieta). Mínimo de 86 aves en un dormitorio en el aeropuerto de Lleida el 23 de agosto de 2012 (M. Gálvez). Se cuentan 150 ejemplares cazando en Puebla del Río, Sevilla, el 2 de septiembre de 2012 (F. Chiclana).

Baleares. En Mallorca, un dilatado paso prenupcial entre el 4 de abril y 7 de mayo de 2011, con un máximo de 11 ejemplares el 27 de abril entre las localidades de la Albufereta, Pollença, y Maria de la Salut (M. Rebassa, R. Mas, G. Carrasco, L. Ventoso, M. Suárez, E. Amengual, J. J. Bazán, A. Ferrero, M. Montier, J. L. Martínez, S. Nicoll/AOB).

Canarias. En Fuerteventura, en el islote de Lobos, La Oliva, primera cita: un individuo macho en vuelo junto al faro el 14 de enero de 2007 (D. Trujillo y J. J. Ramos).

CERNÍCALO PATIRROJO

Falco vespertinus

Observaciones durante el paso prenupcial de 2012: una hembra en Villanueva de Oscos, Asturias, el 24 de mayo (C. Murias y P. Hernández); en Uzquiano, Álava, un macho adulto, un macho subadulto y dos hembras adultas el 26 de mayo (J. M. Pérez de Ana), y una hembra, un joven y un

macho subadulto el día 28 (M. Alonso); en Vizcaya, un ave en el aeropuerto de Bilbao, el 25 de mayo y también observado varios días después (F. Pinto, A. de Pazo y L. Bilbao); en Navarra, un macho en Lizarduria, Bardenas Reales, el 8 de mayo (S. González), cinco ejemplares en Bardenas Reales, el 25 de mayo (R. Pérez), dos ejemplares en Sangüesa el 20 de mayo (J. Sola) y tres ejemplares el día 22 (R. Rodríguez); en La Rioja, un macho de segundo año en Hervías el 20 de mayo, dos machos adultos y un ave de tercer año en la misma localidad el día 23 de mayo y un macho subadulto en Bañares el día 22 de mayo (J. Robres). Una hembra avistada entre Candanos y Caspe, Huesca, el 22 de mayo (A. Gilbertson); una hembra en Sástago, Zaragoza, el 6 de mayo (L. Gracia); un macho y tres hembras en Aiguamolls de l'Emporda, Girona, el 7 de junio de 2012 (M. Carregal); un ave en Arlazón, Burgos, el 30 de abril (F. Hernansanz); una hembra en la carretera de Otero de Sarriegos, R. N. de las Lagunas de Villafáfila, Zamora, el 11 de mayo (A. Arias, P. Santos, R. Díez, X. Piñeiro y C. Osorio) y de nuevo el 12 y 13 de mayo (A. Arias, P. Santos, X. Piñeiro y otros); dos aves de primer verano en Naval Moral de Béjar, Salamanca, el 25 de mayo (R. Montero); un macho en Los Cerralbos, Trujillo, Cáceres, el 17 de mayo (M. Kelsey); una hembra de segundo año en Manjavacas, Cuenca, el 26 de mayo (X. Martín) y una hembra adulta en la isla de Tabarca, Alicante, el 14 de mayo (A. Plata). En invierno, un ave juvenil en el entorno de las lagunas de Campillos, Málaga, el 6 de enero de 2012 (J. A. Cortés).

ALCOTÁN EUROPEO

Falco subbuteo

Canarias. En La Palma, un ejemplar posado en un invernadero en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 3 de junio de 2012 (R. Burton).

HALCÓN DE ELEONORA

Falco eleonora

Observaciones primaverales en 2012: en Cantabria un individuo claro en Unquera, el 16 de junio (M. Quintana y M. Fernández) y el 18 de junio (L. Carrera) y uno en Molleda, el 16 de junio (M. Quintana, R. F. Revuelta y C. Suárez); en Soria

cuatro aves en Matute de Almazán, el 15 de junio (V. Salvador y J. Alcalde) y presencia en Matamala de Almazán, entre el 15 y el 26 de junio con un máximo de 26 aves el día 23 (J. L. Hernández, J. Ruiz, S. Ortega y otros). En Valladolid, dos machos adultos en Boecillo el 29 de mayo, seis adultos el 5 de junio y 16 ejemplares el 12 de junio (J. Sagardía) y uno en Valladolid, el 21 de julio (M. Rodríguez); dos aves en San Miguel de Valero, Sierra de Francia, Salamanca, el 16 de junio (A. González Mendoza); un adulto de morfo claro en Mingorrubio, Madrid, el 9 de junio (M. Zugasti); un adulto en Menasalbas, Toledo, el 15 de junio (Á. Nicolau) y un individuo en Algeciras, Cádiz, el 20 de mayo (J. Elorriaga). Observaciones en periodo postnupcial en 2012: en Navarra uno en la balsa de Zolina, el 28 de agosto (J. Nubla y R. Rodríguez) y uno en el collado de Lindux, Roncesvalles, el 19 de septiembre (Equipo Lindux Migration); en Cádiz uno de morfo claro en alta mar en Tarifa el 18 de agosto (C. Gutiérrez Expósito) y tres ejemplares en Benzú, Ceuta, el 1 de agosto (J. Elorriaga).

HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus

Un censo llevado a cabo en Andalucía en 2011 arrojó la cifra de 297 parejas seguras y 16 probables, presentándose en todas las provincias: en Almería se contaron 58 parejas seguras, 49 en Cádiz y 13 posibles, 15 en Córdoba, 61 en Granada, 9 en Huelva, 45 en Jaén, 59 en Málaga y 3 parejas posibles, y una segura en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

POLLUELA PINTOJA

Porzana porzana

En las lagunas de Villafáfila, Zamora, un adulto el 1 de abril de 2012 (A. del Río, G. Fernández, M. Carregal, C. Osorio y A. Rodrigo) y el 6 de abril (S. Lois y Á. Cantarero), y un ejemplar los días 2 y 6 de junio (C. Osorio). Un ejemplar en el río Valderaduey, Villalpando, Zamora, el 28 de abril de 2012 (X. Piñeiro). Un ave en la laguna de Galisteo, Cáceres, los días 6 y 7 de abril de 2012 (S. Mayordomo, E. Palacios y C. Clemente). Un ave en el Brazo del Este, Puebla del Río,

Sevilla, el 1 de abril de 2012 (F. Chiclana). Un adulto en Cerrado Garrido, Doñana, Sevilla, el 7 de abril de 2012 (A. J. García y J. A. Sarrión). Un individuo en la Rambla Morales, Almería, el 4 de abril de 2012 (C. Cea).

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en encharcamiento del campo de golf de Las Playitas, Tuineje, el 9 de marzo de 2012 (M. Cabrera), y uno en una charca en Los Alares, Antigua, el 21 de abril de 2012 (V. R. Cerdeña).

POLLUELA BASTARDA

Porzana parva

Un macho adulto en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 11 de mayo de 2012 (M. Guereñu). Observaciones en el ámbito del Parque Natural de la Albufera de Valencia: un macho observado en uno de los caminos de la R. N. del Ullal de Baldoví, Sueca, el 6 de octubre de 2009 (P. Vera) y posiblemente el mismo ejemplar el 6 de noviembre de 2009 (P. Vera y M. Sucías); cinco aves (cuatro hembras y un macho) observadas a lo largo de la senda peatonal de la R. N. de la Pipa, el 19 de abril de 2011 (SEO/BirdLife/Voluntariado "Alas sobre agua" y T. Alcocer); observación prenupcial tardía de una hembra en la R. N. del Tancat de la Ratlla, el 1 de junio de 2012 (P. Vera) y observación postnupcial correspondiente a una hembra adulta en la R. N. del Tancat de Milia, Sollana, el 18 de septiembre de 2012 (T. Alcocer). Un macho adulto en el Espacio Natural de Doñana, Sevilla, el 7 de abril de 2012 (A. J. García y J. A. Sarrión). Dos machos y una hembra en el Lucio de las Gangas, Cerrado Garrido, Aznalcázar, Sevilla, el 14 de abril de 2012 (F. Chiclana, J. Salcedo e I. Pablo). En Granada en 2012 un ejemplar en Charca Suárez, Motril, el 7 de abril (S. Peregrina, G. Lage, B. Martín y A. Rodríguez) y un macho en El Padul, el 28 de abril de 2012 (J. I. Álvarez Gil).

Baleares. Un macho en el torrente de Sant Jordi, Pollença, Mallorca el 18 de abril de 2010 (M. Rebassa y M. C. Oriola/AOB).

POLLUELA CHICA

Porzana pusilla

En Aiguamolls de l'Empordà, Girona, un ejemplar el 29 de abril de 2012 (G. de Jesús y A. Mallol),



Polluela chica *Porzana pusilla*. Salinas de Addaia, Maó (Menorca). Foto: Félix de Pablo.

seis aves el 25 de mayo (E. Pous y A. Ollé) y cinco individuos el 30 de junio de 2012 (M. A. Fuentes, A. Casals y G. Dalmau). Un ejemplar en Mora d'Ebre, Tarragona, el 15 de abril de 2012 (E. Pena). En Cerrado Garrido, Doñana, Sevilla, un individuo el 7 de abril (J. A. Sarrión y A. J. García) y el 20 de abril de 2012 (M. Alonso y D. Santamaría). Un ave en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla, el 1 de mayo de 2012 (F. Chiclana). Un ave en Charca Suárez, Motril, Granada, el 7 de abril de 2012 (S. Peregrina, G. Lage, B. Martín y A. Rodríguez). Un ejemplar en la laguna de Cantarranas, la R. N. Laguna de Fuente de Piedra, Málaga el 28 de abril de 2012 (J. Pérez Contreras y J. M. González Cachinero). Un ave en Sollana, albufera de Valencia, Valencia, el 3 de mayo de 2012 (T. Alcocer y C. Varea). En migración postnupcial, un juvenil en Urdaibai, Vizcaya, el 10 de septiembre de 2012 (K. de Dios y J. Cañadas).

Baleares. Un ejemplar en las salinas de Addaia, Maó, Menorca, el 20 de abril de 2011 (F. de Pablo/AOB).

GALLINETA COMÚN

Gallinula chloropus

Canarias. Nuevas localidades de nidificación en Tenerife y La Gomera: el 30 de agosto de 2012 en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, se

observa un adulto y dos pollos muy crecidos; el 10 de mayo de 2011 en La Vera, San Juan de La Rambla, se avistan dos pollos pequeños y un adulto en un estanque, y en el mismo lugar, el 4 de julio de 2011 se observa un juvenil; el 1 de agosto de 2011 en un estanque de El Rincón, La Orotava, se observan dos pollos de una semana junto a una pareja de adultos (D. Trujillo y C. González). En La Gomera, en Agulo, el 14 de junio de 2012, en la presa de la Atalaya, se observa un adulto y un pollo pequeño, y ese mismo día en el embalse de la Palmita se avistan dos parejas de adultos, una de ellas alimentando a dos pollos de una semana de edad, así como un nido con un huevo –probablemente abandonado– en la cola de la presa (D. Trujillo).

CALAMÓN COMÚN

Porphyrio porphyrio

Cría un año más en la laguna de Los Prados, Málaga: un pollo junto a dos ejemplares adultos el 29 de junio de 2012 (J. L. Postigo y J. G. Perales).

Baleares. Cita de cría: un adulto y dos pollos en cala en Porter, Alaior, Menorca, el 21 de mayo de 2011, es la primera cita de cría en esta localidad (X. Méndez/AOB).

FOCHA COMÚN

Fulica atra

Canarias. En Tenerife, nuevas localidades de nidificación: el 20 de junio de 2012 en la balsa de San Antonio, La Matanza, se observan cinco adultos, uno de ellos en un nido todavía sin huevos y copulando con otro ejemplar, aunque el 3 de julio de ese año el nido ha desaparecido como consecuencia de la subida del nivel del agua; el 28 de agosto de 2012 en la balsa de Benijos, La Orotava, se cuentan 10 adultos y un pollo bastante crecido que aún es alimentado por uno de sus progenitores, y además se localiza un nido sobre una pequeña isleta. En otros enclaves ya conocidos previamente, el 23 de mayo de 2012 en la balsa de Tierra de Mesa, San Juan de La Rambla, se contabilizan 18 adultos, de los cuales uno incubaba una puesta de 6 huevos en un nido distinto al mencionado el 30 de marzo de 2012 (véase *Ardeola*, 59: 180) pero que acabó perdiéndose por la subi-

da del nivel del agua; el 30 de agosto de 2012 se visita por última vez esta balsa y se censan 32 ejemplares entre los cuales hay al menos cinco juveniles; el 25 de mayo de 2012 en la balsa La Tabona, La Guancha, se censan 17 aves adultas de las cuales una incubaba tres huevos en un nido ubicado en la orilla norte de la balsa; el 30 de agosto de 2012 se contabilizan 14 ejemplares, encontrándose uno de ellos incubando cuatro huevos en otro nido; el 29 de septiembre de 2012 se observan 13 adultos y dos pollos de mediano tamaño que están siendo alimentados por uno de sus progenitores; ninguno de estos dos nidos es el observado en construcción el 3 de abril de 2012 (véase *Ardeola*, 59: 180); el 30 de agosto de 2012 en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, se contabilizan 98 individuos, entre los que se determina un mínimo de cinco juveniles, y se localizan ocho nidos desocupados en distintas orillas de la balsa (D. Trujillo). Nuevas localidades de nidificación en La Gomera: el 14 de junio de 2012 en la presa de Los Cardones, cerca de Antoncojo, Alajeró, hay 12 aves, una de ellas construyendo un nido. En esa misma fecha, en el embalse de Amalahuigue o de Las Rosas, Agulo, se localiza un adulto incubando cinco huevos, y se cuenta un total de 13 individuos adultos (D. Trujillo). En La Palma, en el sector noreste, en concreto en la laguna de Barlovento, grupo de 10 fochas el 21 de enero de 2012, 12 ejemplares el 7 de febrero de 2012 y de nuevo 10 aves el 5 de marzo de 2012, aunque en el cercano estanque de la zona recreativa hay otro ejemplar que eleva a 11 el total de aves de ese día, y no queda ninguna el 28 de marzo de 2012 (R. Burton).

FOCHA MORUNA

Fulica cristata

Segundo registro en Extremadura: un ejemplar en el embalse de Llerena, Badajoz, el 5 de junio de 2012 (J. Vázquez y F. Montaña). Un ejemplar en Canal Vell, delta del Ebro, Tarragona, el 4 de septiembre de 2012 (M. Illa y R. Aymí).

Baleares. En la albufera de Mallorca se estima que en la temporada 2011 criaron cuatro parejas, se vieron nidos a partir del 26 de febrero y pollos el 16 de mayo (P. Vicens, N. Riddiford, J. Muntaner y R. Mas/AOB).

GRULLA COMÚN

Grus grus

Datos de la población invernante en Andalucía: el número de individuos censados en 2006-2007 se situó en 16.219 aves, repartidos en cinco provincias: 2.100 en Cádiz, 10.275 en Córdoba, 220 en Huelva, 1.284 en Málaga y 2.340 en Sevilla; en la temporada 2008-2009 el número de grullas invernantes se situó en torno a los 13.107 ejemplares que se repartieron como 1.357 en Cádiz, 6.737 en Córdoba, 2 en Granada, 255 en Huelva, 1.328 en Málaga y 3.430 en Sevilla; en la temporada 2007-2008 se contaron en torno a las 10.500 aves, distribuidas como sigue: 1.538 en Cádiz, 5.509 en Córdoba, 7 en Granada, 246 en Huelva, 1.400 en Málaga y 1.771 en Sevilla; en la temporada 2009-2010 se contabilizaron 10.150 individuos localizados en 15 dormideros, los cuales se repartieron de la siguiente forma: 1.927 en un dormidero en Cádiz; en la provincia de Córdoba 4.620 en seis dormideros, 273 individuos en dos dormideros en Huelva, 1.459 en un dormidero en Málaga y 1.871 en Sevilla, y finalmente en el invierno de 2010/2011 fue de 6.813 individuos, repartidos al menos en 18 dormideros: 1.440 individuos en un dormidero en Cádiz; en Córdoba, 2.688 en ocho dormideros; en Huelva 210 en dos dormideros; en Málaga 1.278 en un dormidero y en Sevilla 1.197 en seis dormideros (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Observación en fecha temprana: dos aves en Veta Hornito, Espacio Natural de Doñana, Aznalcázar, Sevilla, el 20 de septiembre de 2012 (F. Chiclana).

SISÓN COMÚN

Tetrax tetrax

Datos de varios censos llevados a cabo en Andalucía: en la primavera de 2007 el censo realizado arrojó la cifra de 5.259 machos reproductores, de los cuales 54 se localizaron en Almería, 192 en Cádiz, 913 en Córdoba, 492 en Granada, 82 en Huelva, 527 en Jaén, 249 en Málaga y 2.750 en Sevilla, mientras que en la primavera de 2010 se calcularon utilizando el hábitat potencial de la especie en su área de distribución, obteniéndose un total de 6.011 machos distribuidos en las pro-

vincias andaluzas de la siguiente forma: 98 machos estimados en Almería, en Cádiz 240, unos 950 machos estimados en Córdoba, en Granada 668, unos 512 en Huelva, en Jaén 175, 216 en Málaga y 3.152 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

AVUTARDA COMÚN

Otis tarda

Datos de la población invernante en Andalucía: en el invierno de 2007 el número de individuos fue de 339, de los cuales 189 se localizaron en Córdoba, 5 en Huelva, 44 en Jaén y 101 en Sevilla; en la invernada de 2008 se censaron 439 individuos, de los cuales 286 se localizaron en Córdoba, 7 en Huelva, 35 en Jaén y 210 en Sevilla; en invierno de 2009 se estimó en 108 machos y 265 hembras (más 1 individuo indeterminado; 374 individuos en total), distribuidos en 10 núcleos o subpoblaciones. Del total, 227 se localizan en Córdoba, 5 en Huelva, 36 en Jaén, y en Sevilla 106; en el invierno de 2010/2011 (censo de diciembre de 2010) se estimó en 473 individuos (159 machos, 293 hembras y 21 individuos indeterminados) que se distribuyen en 10 núcleos o subpoblaciones en las provincias de Córdoba con 218, Sevilla con 170, Jaén con 76 y Huelva con 9 individuos (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Por otra parte, en la época de reproducción: en 2007 se contabilizaron 348 avutardas (78 machos y 270 hembras) encontrándose 2 en Cádiz, 139 en Córdoba, 9 en Huelva, 57 en Jaén y 141 en Sevilla; en 2008 el número de individuos identificados fue de 359, repartidos de la siguiente forma: 3 en Cádiz, 152 en Córdoba, 8 en Huelva, 57 en Jaén y 139 en Sevilla; en 2009 el número de individuos seguros censados fue de 420 y de estimados 441, localizándose como sigue: en Almería 2 individuos seguros y 3 estimados; en Córdoba 157 y 170 estimados; en Huelva 21 y 21 estimados; en Jaén 63 y 66 estimados; y en Sevilla 177 y 181 estimados; y en la temporada 2011, con un número de individuos estimados de 444 (145 machos y 229 hembras) repartidas en las siguientes provincias: 138 en Córdoba, 31 en Huelva, 80 en Jaén y 195 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Un macho en Llanes,

Asturias, el 20 de agosto de 2012 (L. Carrera). Se avistan 10 aves en Berdún, cerca de Jaca, Huesca, el 9 de septiembre de 2012, donde al menos llevaban sedimentadas un mes (M. Sarasa). Cuatro machos y una hembra en Villalobar de Rioja, La Rioja, el 29 de septiembre de 2012 (J. Serradilla).

OSTRERO EUROASIÁTICO

Haematopus ostralegus

Baleares. Destacado paso postnupcial con una concentración de 75 ejemplares el 17 de agosto de 2011 en la albufera de Mallorca, alcanzando un nuevo máximo en Baleares (P. Vivens y N. Riddiford/AOB).

Canarias. En Lanzarote, grupo de ocho aves en vuelo visto a su paso por la playa de Matagorda, Tías, el 17 de marzo de 2012 (G. Tejera). En Tenerife, uno en los bajíos de la Punta del Hidalgo, La Laguna, entre el 6 y el 20 de septiembre de 2012 (R. Fernández Febles). Dicho ejemplar estaba ya en el lugar desde mediados de agosto, pero los últimos días de dicho mes se captura al encontrarse en mal estado, y después de recuperarse, se libera en el mismo lugar a los seis o siete días, permaneciendo allí las semanas siguientes, y constatándose desplazamientos a lugares ajardinados del interior del núcleo urbano, e incluso el 17 de septiembre de 2012 a una charca de riego en el área entre Tejina y Bajamar (A. Alonso y A. Betoret).

AVOCETA COMÚN

Recurvirostra avosetta

Canarias. En Lanzarote, grupo de seis aves en Janubio, Yaiza, el 27 de marzo de 2012 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, grupo de siete alimentándose y en vuelo en El Tarajalillo, Tuineje, el 10 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

CORREDOR SAHARIANO

Cursorius cursor

Canarias. En Lanzarote, cita tardía de nidificación, seguramente relacionada con las condiciones de sequía reinantes durante la temporada: del 18 al 22 de septiembre de 2012, en el Jable de Famara, Tegui, se observa un grupo de siete adultos y cinco pollos de dos edades distintas, incluyendo



Corredor sahariano *Cursorius cursor*. Tegui (Lanzarote). Foto: Beneharo Rodríguez.



Canastera común *Glareola pratincola*. Guadiana del Caudillo (Badajoz). Foto: José Luis Bautista.

alguno que aún no volaba, y estimándose que se trataba de tres parejas cuidando uno, dos y dos pollos, respectivamente (B. Rodríguez, G. Tejera y J. M. Martínez). En Tenerife, en el sector llano próximo a la playa del Confital, Granadilla de Abona, un ejemplar visto el 24 y 26 de marzo de 2012 (V. Díaz Delgado).

CANASTERA COMÚN

Glareola pratincola

Tras un censo realizado en Andalucía en 2010 la población ascendió a 4.431 parejas nidificantes, repartidas en 250 colonias: 68 parejas en Almería, 632 en Cádiz, 52 en Córdoba, 924 en Huelva y 2.655 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Un individuo en los humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, el 3 y 4 de mayo de 2012 (Guardería del Anillo Verde y L. Lobo). Colonia con 200 parejas

en el embalse de La Serena, Badajoz, el 12 de junio de 2012 (Á. Sánchez, D. Rivera y otros). Hasta 300 ejemplares en arrozales de Palazuelo-Campo Lugar, Badajoz-Cáceres, el 26 de julio de 2012 (M. Kelsey) y 200 ejemplares en Guadiana del Caudillo, Badajoz, a lo largo de la primera quincena de agosto de 2012 (J. L. Bautista).

Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, dos aves el 19 de abril, y una el 20 de abril de 2012, aunque se incrementa su número a tres ejemplares el 24 de abril, y se queda una de ellas allí hasta el 30 de abril de 2012 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, cuatro en charca con agua en Manchita Amarilla, Antigua, el 9 de marzo de 2012, y dos alimentándose en El Tarajalillo, Tui-neje, el 10 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

CHORLITEJO CHICO

Charadrius dubius

Canarias. En Tenerife, nuevas localidades de cría en 2012: el 20 de junio en la balsa de la montaña de San Antonio, La Matanza, se observa una pareja de adultos y tres pollos crecidos (D. Trujillo). En esta misma isla, en el municipio de La Laguna, el 12 de mayo se detecta una pareja con comportamiento alarmado, probablemente con pollos, en un estanque situado entre Valle de Guerra y La Barranquera, mientras que en una charca terrosa de Tejina y Bajamar –una nueva localidad de nidificación en la isla–, hay otra pareja con cuatro pollos de algo más de una semana; en distintas fechas posteriores en ese mismo lugar: 9 de junio, 4 de agosto y 1 de septiembre, se observaron dos adultos y dos juveniles (R. Barone, V. R. Cerdeña, J. Vizcaíno y M. Fernández del Castillo). En La Palma, en las Salinas de Fuencaliente, uno los días 11 y 25 de abril de 2012 (R. Burton).

CHORLITEJO PATINEGRO

Charadrius alexandrinus

Dos parejas en el embalse de Alange, Badajoz, el 27 de abril de 2012 (Á. Sánchez). Reproducción por segundo año consecutivo en el embalse de Valdecañas, Cáceres: se observan 72 aves el 19 de abril y 22 parejas el 15 de mayo (Á. Sánchez) y 11 ejemplares y un nido con tres huevos el 17 de junio (J. Prieta, S. Mayordomo y C. Clemente).

En La Rioja, donde hay pocas observaciones, un ejemplar en la cola del embalse de Leiva, el 29 de septiembre de 2012 (J. Serradilla).

Canarias. En Fuerteventura, censo en la playa de Sotavento en Jandía, Pájara, en la zona habitual de recuento de esta especie, contabilizándose tan sólo 39 efectivos adultos la mañana del 5 de abril de 2012 (J. A. Lorenzo y A. B. Frago).

CHORLITO CARAMBOLO

Charadrius morinellus

Durante el paso postnupcial en 2012: se cuentan 95 aves en Quinto, Zaragoza, el 30 de agosto (M. Galán); 126 ejemplares en Albacete el 7 de septiembre (J. A. Cañizares) y 3 en Campanario, La Serena, Badajoz, el 9 de septiembre (J. P. Prieto y J. L. Pérez Chiscano).

Baleares. Uno en el Monte Major, Mallorca, el 9 de septiembre de 2010 (C. Cardona/AOB). En Mallorca, un joven los días 26, 29 y 30 de agosto de 2011 en la albufera de Mallorca (P. Vicens, M. A. Reus, S. Quintanilla, M. Roig y M. A. Dora/AOB); en la misma localidad y seguramente el mismo individuo los días 2 y 3 de septiembre de 2011 (M. G. Painter/AOB). Uno en la sierra de las Figueres, Cabrera, el 3 de septiembre de 2011 (S. Arbona/AOB).



Chorlito carambolo *Charadrius morinellus*. Campanario, La Serena (Badajoz). Foto: Juan Pablo Prieto Clemente.

De 8 a 10 aves en el cabo de Barbaria, Formentera, el 6 de septiembre de 2011 (A. C. Basáñez/AOB).

CHORLITO GRIS

Pluvialis squatarola

Observaciones en paso prenupcial en Extremadura en 2012: uno en Los Barruecos, Malpartida de Cáceres, Cáceres, el 27 de abril (M. Kelsey); dos en el embalse del Paredón, Campanario, Badajoz, el 29 de abril (J. P. Prieto); en arrozales de Palazuelo-Campo Lugar, Badajoz-Cáceres, se observan trece aves el 5 de mayo (M. Kelsey), nueve el 8 de mayo (J. Muddeman) y un ejemplar el 10 de mayo (J. P. Prieto); uno en el embalse de Llerena, Badajoz, el 9 de mayo (F. Montañó); cuatro en arrozales de Puebla de Alcollarín, Badajoz, el 10 de mayo (J. P. Prieto).

CORRELIMOS GORDO

Calidris canutus

Baleares. Un individuo en el Salobrar de Campos, Mallorca, el 28 de mayo de 2011 y otro los días 30

de agosto (J. M. González/AOB), 3 de septiembre (L. Ventoso, S. Quintanilla y J. Manchado/AOB) y 25 de septiembre de 2011 (M. Rebassa/AOB). Un individuo en la albufera de Mallorca el 31 de mayo de 2011 (M. Rebassa, P. Vicens y N. Riddiford/AOB). Un ave en el cabo de las Salines, Santanyí, el 30 de septiembre de 2011 (J. Manchado y L. Ventoso/AOB).

CORRELIMOS TRIDÁCTILO

Calidris alba

Observaciones en Extremadura en 2012: en Cáceres, uno en la laguna de Galisteo el 19 de abril (M. Alonso), un juvenil en el embalse de Valdecañas el 1 de septiembre (S. Mayordomo), cuatro en el embalse de Portaje, el 27 de abril (S. Mayordomo) y uno el 1 de mayo (S. Mayordomo y E. Palacios); en Badajoz, uno en La Haba el 24 de abril (J. P. Prieto), dos en arrozales de Palazuelo-Campo Lugar, Badajoz-Cáceres, el 1 de mayo y un individuo los días 13 y 21 de mayo (M. Kelsey), y finalmente uno en Esparragalejo el 16 de septiembre (V. de Alba y otros).



Correlimos tridáctilo *Calidris alba*. La Haba (Badajoz). Foto: Juan Pablo Prieto Clemente.

CORRELIMOS DE TEMMINCK*Calidris temminckii*

Dos aves en la Reserva Natural Riet Vell-SEO/BirdLife, delta del Ebro, Tarragona, el 22 de julio de 2012 (M. Quintana Becerra y C. Ovín). Observaciones en Badajoz en 2012: uno en la charca de Esparragalejo los días 6 y 11 de abril (F. Montaña, J. P. Prieto y C. Crisóstomo) y tres el 31 de julio (F. Montaña); uno en Palazuelo-Campo Lugar, Badajoz-Cáceres, el 1 de mayo (M. Kelsey); uno en Puebla de Alcollarín el 10 de mayo (J. P. Prieto); dos aves en el embalse de Morantes el 23 de septiembre (S. Mayordomo, C. Clemente y E. Palacios) y un ave en el embalse de Los Canchales el 25 de septiembre (J. Vázquez). Cinco individuos en el Tancat de Milia, Sollana, Valencia, desde el 8 al 19 de octubre de 2012 (T. Alcocer).

CORRELIMOS ZARAPITÍN*Calidris ferruginea*

Baleares. En Mallorca, un nuevo récord histórico con la observación de un bando de 170 ejemplares en el Salobrar de Campos el 28 de julio de 2011 (M. Rebassa/AOB).

CORRELIMOS OSCURO*Calidris maritima*

Tres aves en el tramo costero comprendido entre la punta del Bombo y la punta de Calaburras, Mijas, Málaga, el 30 de enero de 2011 (J. Fregenal y Á. Lupión) y de nuevo un ave el 16 de febrero de 2011 (P. van Munster y F. Ríos).

AGACHADIZA CHICA*Lymnocryptes minimus*

Observaciones en Málaga en 2011: un individuo en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce el 30 de noviembre y uno en la zona de los polígonos industriales el 3 de diciembre (J. A. Cortés y J. Ramírez); uno en el río Guadalhorce, en Pizarra, el 20 de diciembre así como uno capturado para anillamiento en Vélez-Málaga, Málaga, el 15 de diciembre (J. A. Cortés y J. Ramírez). **Canarias.** Primera cita en La Gomera: el 24 de abril de 2012 en la presa de Los Cardones, muy cerca de Antoncojo, Alajeró, se halla el cadáver

de un individuo que lleva en el lugar al menos varias semanas (D. Trujillo).

CHOGA PERDIZ*Scolopax rusticola*

Canarias. En Gran Canaria, donde se conocen pocas citas, nuevos datos que complementan los de *Ardeola*, 57(2) en esta isla: el 12 de julio de 2011 en el barranco de los Hornos, Tejeda, bajo la presa existente en ese lugar se levanta un ejemplar al lado de un naciente y durante el día. En la Vega de San Mateo, el 31 de mayo de 2012 se observa al anochecer un ave en vuelo de cortejo sobre un bosque de *Pinus radiata* y *P. canariensis* en el Morro de la Salvia, mientras que el 5 de junio de 2012, cerca de Montaña de las Mejornas se detecta un individuo que cruza la carretera caminando a primera hora del día (D. Trujillo).

ZARAPITO TRINADOR*Numenius phaeopus*

Paso prenupcial por el interior: cinco aves en las lagunas de Sentíz de Valdepolo, León, el 22 de abril de 2012 (J. A. Arriola).

ARCHIBEBO OSCURO*Tringa erythropus*

Canarias. Observación en el norte de Tenerife: un ejemplar en la balsa de La Cruz Santa, Los Reales, el 30 de septiembre de 2012 (D. Trujillo).



Zarapito trinador *Numenius phaeopus*. Lagunas de Sentíz de Valdepolo (León). Foto: José Ángel Arriola.

ARCHIBEBE FINO*Tringa stagnatilis*

Registros en 2012: uno en la laguna de Camino de Villafranca, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 1 de abril (M. J. Valencia); uno en la laguna de Atapuerca, Burgos, los días 11 y 12 de mayo (D. Santamaría y M. Alonso); un individuo en la Salina Grande, R. N. Lagunas de Villafáfila, el día 14 de mayo (X. Piñeiro y C. Osorio) y el 3 de junio (B. García) que corresponden al segundo y tercer registro para la provincia de Zamora; un ejemplar en la reserva natural Riet Vell-SEO/BirdLife, delta del Ebro, Tarragona, el 21 de julio (M. Quintana Becerra y C. Ovín); dos aves en la Salina del Cabo de Gata, Almería, los días 1 y 2 de agosto (D. González) y uno en el estuario del Guadalquivir, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, los días 22 y 23 de agosto (Ó. Carazo).

Baleares. En Mallorca, nuevo récord histórico con un bando de 26 ejemplares en el paso prenupcial en la albufera de Mallorca el 10 de julio de 2011 (P. Vicens y N. Riddiford/AOB).

ANDARRÍOS BASTARDO*Tringa glareola*

Tres aves en la gravera de Bercianos del Real Camino, León, el 17 de agosto de 2012 (T. Sanz, J. Á. Arriola, M. Novo, J. D. Hernández y B. Durán). **Canarias.** Paso prenupcial acentuado en 2012. En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tías el 16 de marzo (G. Tejera), aunque en dicho lugar se cuentan de forma alternada entre una y tres aves en distintas visitas del 12 de marzo al 22 de mayo con un máximo de siete ejemplares el 13 de mayo (F. J. García Vargas, A. Unquiles y J. Sagardía), y en las salinas de Janubio, Yaiza, cuatro aves el 7 de abril de 2012 (F. J. García). En Fuerteventura, ejemplares solitarios o en parejas en Caleta de Fuste, en el Barranco de la Torre y en Manchita Amarilla, Antigua, el 9 de marzo, en el campo de golf del Barranco de Vinámar, Pájara, y en La Calabaza y El Tarajalillo, Tuineje, el 10 de marzo, así como en el embalse de Los Molinos el 11 de marzo y en el Barranco del Agua Salada, La Oliva, el 12 de marzo (M. Cabrera). Al menos en El Tarajillo, Tuineje, seguía un ejemplar el 7 de abril (J. A. Lorenzo). En El Hierro, entre los días



Andarriños bastardo *Tringa glareola*. Valverde (El Hierro). Foto: Domingo Trujillo.

21 y 27 de marzo, uno en la presa de Tefirabe, Valverde, así como en la balsa de Frontera cinco individuos el 22 de marzo, tres al día siguiente, dos el 26 y sólo uno el 27 de marzo (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez). En La Palma, entre una y tres aves en sendas charcas de riego en Cabrejas y La Costa, Tazacorte, los días 13, 19 y 20 de marzo, siendo quizás las mismas vistas en charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, en distintas ocasiones del 19 al 31 de marzo, así como de tres a cuatro aves entre el 9 y el 24 de abril y una el 13 de mayo (R. Burton).

ANDARRÍOS CHICO*Actitis hypoleucos*

Primer caso confirmado de reproducción en Guipúzcoa: un adulto y un pollo en el río Oria, Irura, el 22 de junio de 2012 (M. Alfonso).

VUELVEPIEDRAS COMÚN*Arenaria interpres*

Observaciones en Extremadura en 2012: en el embalse de Los Canchales, Badajoz, seis ejemplares del 1 al 6 de mayo (F. Lopo y otros) y uno del 1 al 5 de septiembre (F. Montaña y otros); dos

en el embalse de Portaje, Cáceres, el 1 de mayo (S. Mayordomo y E. Palacios) y uno en Esparragalejo, Badajoz, el 12 de agosto (S. Mayordomo, C. Clemente y E. Palacios).

FALAROPO PICOGRUESO

Phalaropus fulicarius

Un ave en la Balsa de El Pontón, Requena, Valencia, el 18 de mayo de 2012 (P. Ruiz Pallardó).

PÁGALO POMARINO

Stercorarius pomarinus

Un ejemplar en Tarifa, Cádiz, el 4 de agosto de 2012 (J. Elorriaga).

PÁGALO PARÁSITO

Stercorarius parasiticus

Dos ejemplares en el collado de Lindux, Pirineo, a 55 km del mar, Navarra, el 25 de agosto de 2012 (A. Llamas).

Baleares. Un ejemplar posiblemente un estival de tercer año, en Cabrera, el 21 de abril de 2010 (M. McMinin y A. Rodríguez/AOB).

Canarias. En Lanzarote, tres aves vistas desde la costa de Arrecife el 16 de abril de 2012 (F. J. García Vargas).

GAVIOTA REIDORA

Chroicocephalus ridibundus

Se reproducen cuatro parejas en la laguna de Meco, Madrid, en la temporada de cría 2012. Sólo dos parejas llegan a sacar adelante pollos (uno cada una), los cuales son vistos por última vez el 11 de julio, ya casi totalmente emplumados. El escaso éxito reproductor ocurrido estuvo relacionado con la sequía observada en la zona y la pronta desecación de la laguna (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente, UAH).

GAVIOTA CABECINEGRA

Larus melanocephalus

En las lagunas de Villafáfila, Zamora, varias observaciones entre los días 9 de abril y 23 de junio de 2012; de uno a cinco aves, el máximo de cinco

se detecta el 11 de mayo, con dos subadultos y tres adultos (X. Piñeiro, A. Rodrigo, C. Osorio y otros). Tras la primera cita de reproducción de la especie en la laguna de Pétrola, Albacete, en 2011 (dos parejas), durante 2012 se comprueba de nuevo la nidificación de cuatro parejas: el 24 de abril se observan cuatro aves echadas, dispersas en una gran colonia de gaviota reidora y durante junio y julio se observan pollos cuidados por todas las parejas (J. Picazo). Un ave de segundo año en arrozales de Palazuelo-Campo Lugar, Badajoz-Cáceres, los días 1, 4 y 21 de mayo de 2012 (M. Kelsey). Al menos 8 aves en el V.R.S.U. de Pinto, Madrid, el 18 de mayo de 2012 (J. Marchamalo).

GAVIOTA ENANA

Hydrocoloeus minutus

Un adulto en plumaje de transición invierno-verano en la playa del Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 30 de enero de 2011 (A. García). Un adulto en La Tancada, Tarragona, el 21 de julio de 2012 (M. Quintana Becerra y C. Ovín).

GAVIOTA DE SABINE

Xema sabini

Un adulto en la bahía de Castro Urdiales, Cantabria, el 3 de septiembre de 2012 (J. Menéndez). Un adulto entrando al mar Mediterráneo frente a Tarifa, Cádiz, el 22 de septiembre de 2012 (J. Elorriaga).

GAVIOTA DE AUDOUIN

Larus audouinii

Se censan 546 nidos en el delta del Llobregat, Barcelona, el 8 de junio de 2012 (F. López/E. N. Delta del Llobregat). Observaciones en 2012 fuera de las zonas habituales: un ave de tercer año en Moaña, Pontevedra, el 3 de mayo (J. R. Gómez González); un ave de segundo año en Gozón, Asturias, el 6 de mayo (D. López Velasco); un adulto en San Vicente de la Barquera, Cantabria, el 29 de mayo (A. García Herrera); un adulto en el vertedero de Zaragoza el 30 de abril (L. Gracia); un adulto en las lagunas de Villafáfila, Zamora, los días 11 y 13 de mayo (X. Piñeiro y J. A. Hernán-



Gaviota de Audouin *Larus audouinii*. Vertedero de residuos sólidos de Pinto (Madrid). Foto: Javier Marchamalo.

dez); un ave de tercer verano en los Llanos de Cáceres, el 12 de mayo que corresponde al segundo registro en la provincia de Cáceres (S. Mayordomo y E. Palacios); un ave de segundo año en el Azud de Riobobos, Salamanca, el 25 de mayo (R. Vicente), y en Madrid, en el V.R.S.U. de Pinto, un ejemplar de segundo verano el 18 de mayo y un ejemplar joven del año el 31 de julio (J. Marchamalo), así como un juvenil el 18 de agosto (M. Juan), además otro juvenil pero en el V.R.S.U. de Colmenar Viejo, Madrid, el 25 de agosto (M. Juan).

Baleares. En Eivissa, nueva localidad de cría en los estanques salineros de Ses Salines, Sant Josep, con la observación de dos pollos junto a un bando de 80 adultos el 22 de junio de 2011 y posteriormente se detectan 21 nidos y 40 individuos el 23 de junio de 2011 (O. Martínez/AOB).

GAVIOTA DE DELAWARE

Larus delawarensis

Un segundo invierno en el puerto de Málaga el 20 de febrero de 2011 (S. García Barcelona). Un ave de segundo año en Deltebre, Tarragona, el 12 de abril de 2012 (R. Gutiérrez).

GAVIOTA CANA

Larus canus

Un ejemplar en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 6 de enero de

2011 (Á. García y A. M. Pérez). Un juvenil en el V.R.S.U. de Colmenar Viejo, Madrid, el 16 de septiembre de 2012, corresponde a la primera observación registrada en este mes en Madrid pues habitualmente llegan de octubre en adelante (M. Juan).

Baleares. Un ejemplar de primer invierno en el puerto de Palma, Mallorca, el 11 de marzo de 2011 (M. Rebassa/AOB).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA

Larus argentatus

Un ave de segundo año en el puerto de Tarragona el 28 de abril de 2012 (A. Cama y otros). Avistamientos en vertederos de Madrid en 2012: en el V.R.S.U. de Pinto un primer invierno el 13 y 23 de abril y uno de cuarto verano el 23 de abril (J. Marchamalo) y en el V.R.S.U. de Colmenar Viejo un ave mudando a cuarto invierno y otra a tercer invierno el 8, 16 y 23 de septiembre (D. González, M. Juan y J. Ruiz) y un ave de cuarto invierno y otra de tercer invierno en el vertedero de Pinto, Madrid, el 13 de octubre, pero vistas semanas antes en el de Colmenar Viejo (M. Juan).

Baleares. Un ejemplar posiblemente de cuarto invierno el 23 de noviembre de 2011 en el muelle viejo del puerto de Palma, Mallorca (M. Rebassa/AOB).

GAVIOTA PATIAMARILLA

Larus michahellis

Reproducción en Extremadura, y en el año 2012: en la única localidad donde se conoce la cría en años anteriores, el embalse de Valdecañas, Cáceres, se observan 36 ejemplares el 26 de mayo; 22 aves, algunas territoriales, el 17 de junio; y 16 individuos, incluyendo dos jóvenes del año, el 7 de julio (S. Mayordomo, C. Clemente y J. Prieta). Varios ejemplares incluyendo juveniles en el embalse de Alange, Badajoz, el 12 de julio de 2012 (Á. Sánchez, J. M. Castaño y J. M. Rama). Se confirma por segundo año la cría en la provincia de León de una pareja instalada en un viejo nido de cigüeña junto al viaducto de Riaño: el 16 de julio de 2012 se observa un pollo totalmente emplumado en el nido acompañado de un adulto, mientras que el otro adulto vuela por los



Gavión atlántico *Larus marinus*. Zierbena (Vizcaya). Foto: Jon Hidalgo.

alrededores (T. Sanz, M. Novo, B. Prieto y J. D. Hernández). Se avista un ejemplar joven del año en V.R.S.U. de Pinto, Madrid, anillado con PVC y procedente de las colonias de Argelia el 23 de julio de 2012 (J. Marchamalo; véase Baaloudj *et al.*, 2012).

Canarias. En La Gomera, dato de cría: el 15 de junio de 2012 en el roque de Iguala, Vallehermoso, se observa un pollo colicorto en compañía de un adulto (D. Trujillo).

GAVIÓN ATLÁNTICO

Larus marinus

Se constata el intento de reproducción en 2012 en la provincia de Vizcaya: se trata de la primera ocasión conocida y tuvo lugar en el enclave de Punta Lucero, Zierbena, en una pequeña colonia de unas 70 parejas de gaviota patiamarilla y una pareja de cormorán moñudo. La pareja defendía el nido de la cercanía de las patiamarillas que, a diferencia de los de éstas, no estaba construido con herbáceas sino con material más grueso. El nido estuvo hecho a finales del marzo y fue ocupado hasta mediados de mayo si bien no llegó

a realizarse la puesta (J. Hidalgo, M. Olondo e I. García Serna). Nueva localidad de nidificación en Asturias: se observan dos ejemplares en el islote La Erbosa, en cabo de Peñas, Asturias, el 9 de junio de 2012; el 23 de junio se descubre un adulto en el islote, acompañado de un pollo bastante crecido, del que no se separa, mientras que otro adulto permanece nadando en las cercanías. En esta zona se estuvieron observando hasta tres adultos ya en el mes de enero (M. Quintana). Observación en el interior peninsular: un primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid, el 26 de febrero de 2012 (M. Juan, D. González y J. Ruiz) y de nuevo el 8 de marzo de 2012 (M. Juan).

GAVIOTA TRIDÁCTILA

Rissa tridactyla

Un ejemplar de primer verano en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 17 de mayo de 2012 (H. García Peña).

Baleares. Un inmaduro en el cabo Enderrocat, Lluçmajor, Mallorca, el 8 de enero de 2011 (M. McMinn/AOB).

Canarias. En Fuerteventura, un inmaduro en vuelo sobre la zona portuaria de Gran Tarajal, Tuineje, el 24 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

PAGAZA PICONEGRA

Gelochelidon nilotica

Canarias. En Tenerife, en el litoral de El Cabezo en El Médano, Granadilla de Abona, un adulto el 19 de julio de 2012 (J. A. Lorenzo y J. González).

PAGAZA PIQUIRROJA

Hydroprogne caspia

Un ejemplar en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 1 de septiembre de 2012 (S. Mayordomo). Un ejemplar en el embalse de Linares, Segovia, el 5 de septiembre de 2012 (H. M. Antequera). Dos ejemplares en Castropol, Asturias, el 26 de septiembre de 2012 (J. M. Alonso). Hasta cinco aves, aparentemente todas adultas, sobrevolando la R. N del Tancat de Milia, Sollana, Valencia, el 5 de octubre de 2012 (T. Alcocer) y 12 aves en las salinas de San Antoni, en el delta del Ebro, Tarragona, el 15 de septiembre de 2012 (R. Gutiérrez, F. Chiclana, L. Ventoso, B. Molina y otros).

Baleares. Un adulto en el puerto de Pollença el 8 de octubre de 2011 (G. Dawes/AOB). Un adulto en la albufera de Mallorca el 24 de septiembre de 2011 (M. Rebassa/AOB).

CHARRÁN PATINEGRO

Sterna sandvicensis

Segundo registro en Extremadura: un ejemplar en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 21 de junio de 2012 (Á. Sánchez, M. Flores y J. A. Guerrero).

Canarias. En Lanzarote, en Arrecife, y en concreto en la Marina de Arrecife, grupo de unas 500 aves entre el 19 y el 24 de marzo de 2012 (G. Tejera).

CHARRÁN COMÚN

Sterna hirundo

Observaciones en humedales de la provincia de Cáceres en 2012: hasta 11 aves en el embalse de

Guadiloba el 26 de abril (G. Schreur y S. McAvoy); un adulto en el embalse de Ahigal el 26 de abril (J. Prieta y S. Mayordomo) y siete aves el 27 de abril (A. Pacheco); doce individuos en el embalse de Portaje el 27 de abril (S. Mayordomo); en el embalse de Valdecañas, donde al menos crió una pareja en 2011, se observan dos adultos el 21 de junio (Á. Sánchez, M. Flores y J. A. Guerrero) y un inmaduro de segundo año el 7 de julio (S. Mayordomo), y en el embalse de Arrocampo una pareja con cebas de cortejo el 17 de mayo (J. Prieta). Otras observaciones en el interior en 2012: en el embalse de Alange, Badajoz, cuatro ejemplares el 21 de junio y uno el 12 de julio (Á. Sánchez y otros); en Burgos, uno en la gravera de Sasamón el 28 de abril (N. Gallego), dos en la balsa de Arauzco de Sulce el 28 de abril (J. Martín) y uno en el embalse del Ebro el 30 de abril (J. Morala); en Zamora uno en el embalse de Ricobayo el 28 de abril (M. A. Pomedá) y un ave en el azud de Riobobos, Salamanca, el 10 de julio (A. Ceballos).

Baleares. En la temporada 2011 se estiman 13 parejas en la albufera de Mallorca, con observación de huevos a partir del 13 de junio, de pollos el 4 de julio y juveniles el 29 de julio (P. Vicens y N. Riddiford/AOB).

CHARRÁN ÁRTICO

Sterna paradisaea

En la Salina de La Tapa, Puerto de Santa María, Cádiz, una hembra o juvenil el 23 de agosto de 2012 y un ave de segundo año el 25 de agosto (R. García).

CHARRÁN BENGALÍ

Sterna bengalensis

Se contabilizaron 240 aves por la playa del Chorrillo, en la bahía sur de Ceuta, en dirección este, el 5 de octubre de 2012 (J. Jiménez Martínez).

CHARRANCITO COMÚN

Sternula albifrons

Colonia con 100 parejas en el embalse de La Serena, Badajoz, el 12 de junio de 2012 (Á. Sánchez, D. Rivera y otros).

FUMAREL ALIBLANCO*Chlidonias leucopterus*

Un ejemplar en Rambla Morales, Cabo de Gata, Almería, el 9 de abril de 2012 (R. Martín). Un adulto en las lagunas de Villafáfila, Zamora, los días 10 y 11 de mayo de 2012 (X. Piñeiro, A. Rodrigo y C. Osorio). En Ciudad Real, un ejemplar en el Alcázar de San Juan el 12 de mayo de 2012 (G. Martín), uno en la Laguna de la Vega de San Mateo el 31 de mayo de 2012 (R. Martínez) y un juvenil en la laguna de Navaseca, Daimiel, el 24 de agosto de 2012 (J. Muddeman). Dos adultos en la laguna de Manjavacas, Cuenca, los días 19 (Ó. Llama, G. Martín y J. Álvarez) y 22 de mayo de 2012 (Á. Nicolau). Un ave en la laguna de Pétrola, Albacete, el 19 de mayo de 2012 (R. Torralba). Se avista un individuo adulto en el aeropuerto de Bilbao (Sondika-Loiu), Vizcaya, el 13 de junio de 2012 (A. de Pazo). Un adulto en la salina de La Tapa, Puerto de Santa María, Cádiz, el 29 de agosto de 2012 (R. García).

ALCA COMÚN*Alca torda*

Un ejemplar en Santoña, Cantabria, el 25 de junio de 2012 (A. García Herrera).

FRAILECILLO ATLÁNTICO*Fratercula arctica*

Un individuo en el puerto del Hombre, en plena Sierra de las Nieves, Ronda, a 1.350 metros sobre el nivel del mar y más de 40 km de la costa más cercana, Málaga, el 11 de diciembre de 2010. El ave presentaba dificultades para volar e ingresó y se recuperó en un centro de recuperación (I. Cáceres).

Baleares. Uno en Cabrera el 4 de marzo de 2011 (A. Rodríguez y M. McMinn/AOB). Un individuo, en el que se aprecia el inicio de la coloración típica del pico, en Sa Dragonera, el 5 de marzo de 2011 (R. Mas, M. Rebassa, L. Parpal y L. Ventoso/AOB).

GANGA ORTEGA*Pterocles orientalis*

Datos de varios censos en Andalucía: el número de individuos en 2007 fue de 697, repartidos por las provincias andaluzas excepto Cádiz: en Almería se censaron 16, 156 en Córdoba, 232 en Granada, 23 en Huelva, 61 en Jaén, 21 en Málaga y 40 en Sevilla; en 2010 se censaron un total de 803 individuos repartidos en seis provincias: 141 en



Charrán bengalí *Sterna bengalensis*. Playa del Chorrillo (Ceuta). Foto: José M^a Cárceles Moreno.

Almería, 97 en Córdoba, en Granada 350, 16 en Huelva, 135 en Jaén, 34 en Málaga y 30 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

GANGA IBÉRICA

Pterocles alchata

En 2007 se estimaron entre 400 y 600 individuos en Andalucía y se distribuyó en el entorno del Espacio Natural de Doñana, a caballo entre las provincias de Cádiz con 32, Sevilla y Huelva con 253 (pertenecen a la misma población) y un pequeño núcleo aislado en el norte de Córdoba con 4 individuos. En 2010 el censo mostró una población de 201 individuos, repartidos por tres provincias: 20 aves en Cádiz, 54 en Córdoba y 127 en Sevilla (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía). Bando de 600 ejemplares en los Llanos de Cáceres, Cáceres, el 24 de septiembre de 2012 (A. Mogená).

TÓRTOLA SENEGALESA

Streptopelia senegalensis

Canarias. Citas que complementan el proceso de expansión de la especie en las islas (véase Lorenzo, 2007): en Fuerteventura el 12 de enero de 2007 en Tesejerague, Tuineje, se observa un adulto (J. J. Ramos y D. Trujillo). En Tenerife, dos ejemplares en un jardín en Costa Adeje, Adeje, el 7 de septiembre de 2012 (B. Fariña Trujillo). En La Gomera, vistos distintos ejemplares en la zona de Borbalán y La Puntilla, Valle Gran Rey (La Gomera) en distintas ocasiones en los veranos de 2010 y 2012, incluyendo un ejemplar en cortejo el 27 de julio de 2012 cerca del Charco del Conde. Se estima que en la zona puede haber unas 20 aves aproximadamente (J. L. Rodríguez).

En El Hierro, primera cita: un ejemplar posado en el paseo marítimo en La Restinga, El Pinar, el 17 de octubre de 2012, coincidiendo con temporal de viento y lluvia (M. Gil Velasco).

COTORRA ARGENTINA

Myopsitta monachus

Tres parejas en un nido comunal en un eucalipto en Melilla el 13 de agosto de 2012 (D. Jerez).



Tórtola senegalesa *Streptopelia senegalensis*. La Restinga, El Pinar (El Hierro). Foto: Marcel Gil Velasco.

CRÍALO EUROPEO

Clamator glandarius

Un juvenil en un pinar junto al polígono industrial de Cistierna, Vidanes, León, el 27 de julio del 2012 (J. Á. Arriola). Un ejemplar juvenil en cabo Peñas, Gozón, Asturias, desde el 18 al 23 de agosto de 2012 (M. Quintana, C. Ovín, M. A. F. Pajuelo, R. F. Revuelta y P. García-Rovés).

Baleares. En Menorca, un ejemplar ingresa el 23 de marzo de 2011 en el centro de recuperación de la fauna, posteriormente es liberado en buen estado (E. Coll/AOB).

Canarias. En La Palma, un joven capturado por un particular en La Camacha, Puntallana, el 24 de julio de 2012; el ejemplar puede recuperarse y al día siguiente se anilla y libera en el mismo lugar (F. M. Medina).

BÚHO CHICO

Asio otus

Concentración invernal: 12 ejemplares en un cortijo en las inmediaciones de Archidona, Málaga, el 25 y 28 de diciembre de 2011 y el 7 de enero de 2012 (M. C. Segarra, A. Aguilar, G. Carreño, A. M. Pérez, A. M. Pérez, B. Martín y F. Botella). Aumento en el municipio de Cabra, Córdoba: de dos parejas en el año 2002 se pasa a nueve parejas en la temporada 2012 (A. Pestana).



Búho campestre *Asio flammeus*. La Laguna (Tenerife). Foto: Rubén Barone.

BÚHO CAMPESTRE

Asio flammeus

Tres aves en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 28 de noviembre de 2010 (J. A. Maldonado y otros). Destacada concentración invernral: 25 ejemplares en Huerta Tejada, Espacio Natural de Doñana, Aznalcázar, Sevilla, el 17 de diciembre de 2012 (F. Chiclana). **Canarias.** En Tenerife, en Los Rodeos, La Laguna, en el entorno del recinto aeroportuario, dos ejemplares observados entre los días 11 de diciembre de 2011 y 31 de enero de 2012, y al menos uno a partir de esa fecha, y hasta el 27 de marzo de 2012 (R. Barone, V. R. Cerdeña, J. Vizcaíno, B. Rodríguez, M. Fernández del Castillo y R. Larsson); otras dos citas de estas dos aves se efectúan cerca de la Montaña del Aire y en la Montaña de Barro, La Esperanza, el 3 de marzo de 2012 (A. Hernández, G. Hernández y D. Martínez).

CHOTACABRAS EUROPEO

Caprimulgus europaeus

Observación de un migrante tardío, ya en plena época de reproducción: un ave en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 2 de junio de 2011 (J. Fregenal y J. A. Cortés).



Chotacabras cuellirrojo *Caprimulgus ruficollis*. Castrotierra de la Valduerna (León). Foto: Tomás Sanz.

CHOTACABRAS CUELLIRROJO

Caprimulgus ruficollis

Observación tardía: un ejemplar en las afueras de Málaga, zona este de la ciudad, el 23 de noviembre de 2011, aunque ya se venía observando en la zona desde finales de octubre hasta el 11 de noviembre (M. del Mar Roca). Se recoge un ejemplar herido, posiblemente atropellado, en la localidad de Castrotierra de la Valduerna, León, el 13 de agosto de 2012; esta especie es muy escasa en la provincia, con tan sólo cinco parejas reproductoras estimadas, y sin apenas noticias sobre su estatus actual (T. Sanz).

VENCEJO COMÚN

Apus apus

Concentración de vencejos en una pared de un edificio de la urbanización Parque Verónica, Antequera, Málaga, el 21 de mayo de 2012. A primera hora de la mañana se observa la acumulación de decenas de ejemplares en dos grupos, apelotonados sobre una pared sin relieve, aunque con cierta aspereza en su superficie. Los individuos se fueron retirando progresivamente y sobre las 9:00 horas de la mañana mostraban el aspecto de la fotografía, este hecho coincidió con un descenso notable de temperaturas y, en general, con temperaturas inusuales para esas fechas; además, el día



Vencejo común *Apus apus*. Antequera (Málaga). Foto: Julio Carralero.

anterior, coincidiendo con dicho descenso, se observó a numerosos ejemplares intentando entrar en los estrechos huecos de las ventanas de la cercana urbanización Bellavista (J. Carralero).

VENCEJO PÁLIDO

Apus pallidus

Cuatro ejemplares en Getxo, Vizcaya, el 20 de agosto de 2012 (K. de Dios). Dos aves en Zamora capital, Zamora, el 1 de septiembre de 2012 (J. A. Hernández).

VENCEJO REAL

Apus melba

Canarias. En fechas típicas de paso, observaciones en varias islas. En Fuerteventura, uno en Pájara el 11 de septiembre de 2012, y cuatro aves

en el campo de Golf de Las Playitas, Tuineje, el 12 de septiembre de 2012 (V. R. Cerdeña). En La Palma, uno sobrevolando charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 29 de mayo de 2012 (R. Burton).

VENCEJO CAFRE

Apus caffer

En Alía, Las Villuercas, Cáceres, se observan dos ejemplares en el río Guadarranque el 12 de mayo de 2012 y otros dos en el estrecho de la Peña el día 30 de mayo (J. Cerezo y J. A. Herrera). En Alange, Badajoz, un ejemplar el 18 de mayo de 2012 (J. Porras y M. Kelsey) y una pareja los días 20 y 23 de junio (J. A. Román). Tres ejemplares en Puebla de Obando, Sierra de San Pedro, Badajoz, el 15 de julio de 2012 (J. Mazón).

CARRACA EUROPEA

Coracias garrulus

Un juvenil en Villaverde de Arcayos, León, el 27 de agosto de 2012 (J. Á. Arriola).

Canarias. En Fuerteventura, dos en el campo de golf existente en el Barranco de Vinámar, Pájara, el 10 de marzo de 2012, y una alimentándose de invertebrados en gaviás sembradas en El Frontón, Antigua, el 22 y 23 de mayo de 2012 (M. Cabrera).

ABUBILLA

Upupa epops

Baleares. Durante el paso primaveral se constata en 2011 un flujo destacado de hasta 23 capturas para anillamiento en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, entre el 1 de abril y el 3 de mayo de 2011 (R. Escandell/AOB).

Canarias. En Tenerife, un ejemplar cantando en unos terrenos junto a una urbanización en Los Realejos el día 28 de abril de 2012, en un sector de la isla donde actualmente es rara (R. Barone).

TORCECUELLO EUROASIÁTICO

Jynx torquilla

Baleares. Se constata un destacado paso migratorio prenupcial con un inusual número de ejem-

plares capturados para anillamiento: 11 aves en un solo día en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 22 de abril de 2011 (R. Escandell/AOB).

Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, uno en mal estado que pudo ser capturado para su recuperación el 18 de abril de 2012 (F. J. García Vargas).

PICO MENOR

Dendrocopos minor

Un macho adulto posado en un fresno en un mosaico de fresnedas, setos y prados en Rascafría, Madrid, el 24 de junio de 2012 (D. Aparicio, A. Aparicio, P. Pascual y R. Aparicio).

ALONDRA RICOTÍ

Chersophilus duponti

Datos de la población Andaluza: en 2007 un censo arrojó la cifra de 20 machos reproductores, encontrándose 8 en El Padul, Granada, y 12 en Almería (3 en la ZIAE Reserva de Las Amoladeras en el P. N. Cabo de Gata-Níjar, 4 en ZIAE de los Llanos de Canjáyar, en la Sierra de Gádor, y 5 en Los Sebastianes, en Sorbas-Lucainena de las Torres); en 2008, se identificaron 23 machos, encontrándose 7 machos reproductores en la provincia de Granada (5 en las Lomas del Padul, dentro de los límites de la ZIAE de El Temple-Lomas del Padul, 1 en el Monte Atochares en Benamaurel y 1 en Cerro Botardo, Huéscar) y 16 en Almería (2 en la ZIAE Reserva de Las Amoladeras en el P. N. Cabo de Gata-Níjar, 3 en la ZIAE de los Llanos de Canjáyar, 1 en el Llano de la Mota, 1 en La Campita en la Sierra de Gádor y 9 en Los Sebastianes en Sorbas-Lucainena de las Torres); en 2009 se censaron 34 machos distribuidos en Almería con 26 machos seguros y Granada con 8, y en ninguna provincia se identificaron machos probables; por último, en la temporada de reproducción de 2011 se contó un mínimo de 22 machos seguros y cuatro probables, y solo estuvo presente en las provincias de Almería y Granada, y se detectaron en seis localidades distribuidas en cinco áreas: en Granada, Sierra de Baza-Filabres con 3 machos y Padul con 5; en Almería, Gata-Níjar con 5 machos, Gádor con 2 (en distintas localidades) y Tabernas-Sorbas en Almería con 6

machos (Programa de seguimiento de fauna silvestre de la Junta de Andalucía).

CALANDRIA COMÚN

Melanocorypha calandria

Baleares. En Mallorca, cuatro ejemplares desde el 4 al 6 de abril de 2011 en el blanquer de María de la Salut (M. Rebassa/AOB).

TERRERA COMÚN

Calandrella brachydactyla

Canarias. En Fuerteventura, grupo de unos 30 ejemplares en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 11 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

AVIÓN ZAPADOR

Riparia riparia

Dos ejemplares capturados para anillamiento en Puebla del Río, Sevilla, el 19 de enero de 2012; uno de ellos muestra muda activa, lo que sugiere posible invernada en la zona (G. O. Zamalla).

Canarias. En La Palma, bando de unas 15 aves sobrevolando un grupo de charcas de riego en La Costa, Tazacorte, el 19 de marzo de 2012, así como uno en compañía de golondrinas comunes y aviones comunes el 24 de abril de 2012 (R. Burton).

GOLONDRINA COMÚN

Hirundo rustica

Cinco ejemplares capturados para anillamiento en Puebla del Río, Sevilla, el 19 de enero de 2012; uno de ellos muestra muda activa, lo que sugiere posible invernada en la zona (G. O. Zamalla).

GOLONDRINA DÁURICA

Hirundo daurica

Un ave en el término municipal de Vélez Málaga, a la altura de la autovía, entre Torre del Mar y Vélez Málaga, el 15 de diciembre de 2011 (J. A. Cortés). Dos ejemplares cogiendo barro en Arnedo, La Rioja, el 23 de mayo de 2012 (J. Ucha). Un ejemplar adulto volando en el entorno del Pico Moro, Aleje, León, a unos 1.700 m.s.n.m., el 27

de junio de 2012 (T. Sanz y M. Novo). Dos parejas crían con éxito, ambas debajo de un viaducto, en Siero, Asturias, una cebaba al menos dos pollos el 4 de agosto de 2012 cerca de Bendición, en Siero, y se vio por última vez un individuo en las cercanías el 26 de agosto y la otra pareja, mucho más tardía, cebaba pollos el 21 de septiembre bajo el viaducto de Arniella, donde los últimos individuos se vieron el 2 de octubre (J. M. Marín Calzado).

Baleares. En Mallorca, destaca la presencia primaveral de un ejemplar en el camino Vell de Costitx el 6 de mayo de 2011 (M. Rebassa/AOB). Presencia primaveral-estival, cuatro aves en Son Ferrer, Calvià, Mallorca, el 3 de junio de 2011 (P. A. Garnett/AOB). Un nido dentro de un transformador en la albufera del Grau, Maó, Menorca, el 8 de junio de 2011 (Ll. Capellà/AOB). Seis aves bajan a beber en la piscina municipal de S'Arracó, Andratx, Mallorca, el 10 de julio de 2011 (J. J. Bazán/AOB). Segunda cita de nidificación en Mallorca: se localiza un nido con dos ejemplares debajo de un puente en el puerto de Andratx, Mallorca, el 10 de julio de 2011 y posteriormente dos adultos y dos pollos van a dormir al mismo nido del 15 al 17 de julio (J. J. Bazán/AOB). Dos adultos y tres jóvenes en las salinas de la Concepción, Es Mercadal, Menorca, el 1 de septiembre de 2011 (J. Florit/AOB).

Canarias. En El Hierro, el 21 de marzo de 2012 entre las Casas de Guinea y El Lunchón, La Frontera, se observa un ejemplar adulto en vuelo (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez). En La Palma, un ejemplar entre vencejos sobrevolando una zona de charcas de riego en La Costa, Tazacorte, el 31 de marzo de 2012, y otro en compañía de golondrinas comunes y aviones comunes en la misma zona pero los días 28 y 30 de abril de 2012, así como otro ejemplar, esta vez junto a golondrinas comunes, en Cabrejas, Tazacorte, el 4 de junio de 2012 (R. Burton).

BISBITA CAMPESTRE

Anthus campestris

Canarias. Citas del paso prenupcial. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, una el 5 de marzo de 2012 (J. Sagardía), aumentando a dos el día 6 y de nuevo dos el 8 de abril de 2012 (F. J. García Vargas y J. Sagardía). En Fuerteventura,

dos en un campo de golf de Caleta de Fuste, Antigua, el 9 de marzo de 2012, otras dos en una de las laderas del embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 11 de marzo de 2012, y tres en vegetación próxima al encharcamiento del Barranco de Agua Salada, La Oliva, el 12 de marzo de 2012 (M. Cabrera). En Tenerife, tres ejemplares junto a un campo de golf en San Miguel de Abona y uno en Las Galletas, Arona, el 25 de marzo de 2012 (V. R. Cerdeña, R. Barone, J. Vizcaíno y M. Fernández del Castillo).

BISBITA ARBÓREO

Anthus trivialis

Canarias. En Fuerteventura, grupo de unos 20 ejemplares en el campo de golf existente en el Barranco de Vinámar, Pájara, el 10 de marzo de 2012, y unas 25 aves en el césped del campo de golf de Las Playitas, Tuineje, el 25 de marzo de 2012 (M. Cabrera). En esta misma isla, dos en césped de jardines de complejo turístico cerca de la playa de Sotavento de Jandía, Pájara, el 5 de abril de 2012 (J. A. Lorenzo y A. B. Fragosó).

BISBITA GORGIRROJO

Anthus cervinus

Un individuo en el cauce nuevo del río Guadaira, Puebla del Río, Sevilla, el 18 de marzo de 2012 (F. Chiclana). Uno en Tapia de Casariego, Asturias, el 3 de mayo de 2012 (M. Quintana y R. Fernández). Uno, posiblemente hembra, en Salave, Tapia, Asturias, el 3 de mayo de 2012 (X. Gayol, M.



Bishita arbóreo *Anthus trivialis*. Tías (Lanzarote). Foto: Juan Sagardía.

Quintana y R. F. Revuelta). Un adulto en San Rafael, El Espinar, Segovia, el 15 de mayo de 2012 (G. Izquierdo).

Baleares. Uno en los alrededores de María de la Salut el 5 y 6 de abril, el 3 de mayo de 2011 y también allí el 14 de noviembre de 2011 (M. Rebassa/AOB). Uno en el llano de Lanzell, Vilafranca, el 8 de abril de 2011 (A. Muñoz y C. Artigues/AOB). Un ejemplar en la albufera de Mallorca el 7 y 28 de abril de 2011 (P. Vicens, N. Riddiford y M. Rebassa/AOB). Uno en la albufera de Mallorca el 14 de noviembre de 2011 (M. Rebassa/AOB).

Canarias. En Fuerteventura, cinco ejemplares posados en laderas del embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 11 de marzo de 2012, y dos en un campo de golf de Caleta de Fuste, Antigua, el 26 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

LAVANDERA BOYERA

Motacilla flava

Observaciones de la subespecie *thunbergi* (Escandinavia) cuya presencia es rara durante los pasos migratorios en la parte occidental ibérica. En Asturias, en el tramo de costa Llanes villa-Poo, en 2009 un macho el 30 de mayo y en 2011, siete machos en total: un macho el 19 de abril; un macho del 10 al 19 de mayo; un grupo de cuatro machos el 13 de mayo; y un macho el día 27 de

mayo (F. Nieto). Un macho de esta subespecie en Galisteo, Cáceres, el 29 de septiembre de 2012 (S. Mayordomo).

Canarias. Observación en El Hierro: el 22 de marzo de 2012 en la balsa de Frontera se observa un macho, probablemente perteneciente a la subespecie nominal (D. Trujillo).

LAVANDERA BLANCA

Motacilla alba

Baleares. Un individuo de la subespecie *yarrellii* en la zona humedal de Sant Jordi, Palma, Mallorca, el 25 de febrero de 2011 (M. Rebassa/AOB).

RUISEÑOR COMÚN

Luscinia megarhynchos

Canarias. En Lanzarote, uno en Montaña Blanca, San Bartolomé, los días 21 y 22 de abril de 2012 (J. Sagardía).

COLIRROJO REAL

Phoenicurus phoenicurus

Reproducción en Badajoz: se captura para anillamiento un joven, recién salido del nido, en La Lapa, en una zona de monte mediterráneo, con alcornocal y encinar, el 17 de junio de 2012 (H. Gómez-Tejedor).



Lavandera boyera *Motacilla flava thunbergi*. Llanes (Asturias). Foto: Fran Nieto.



Ruiseñor común *Luscinia megarhynchos*. San Bartolomé (Lanzarote). Foto: Juan Sagardía.

TARABILLA NORTEÑA*Saxicola rubetra*

Canarias. En Lanzarote, una en el campo de golf de Tías el 19 de abril de 2012 (F. J. García Vargas) y otra en el campo de golf de Tegui el 23 de abril de 2012 (J. Sagardía). En Fuerteventura, una en el Barranco de la Torre, Antigua, el 22 de abril de 2012 (V. R. Cerdeña). En esta misma isla, complementando los datos invernales publicados en *Ardeola*, 59(1): 190-191, un ejemplar en el campo de golf de Las Playitas, Tuineje, el 6 de enero de 2012 (M. Cabrera). En La Gomeira, segunda cita: en El Cercado, Vallehermoso, se observa un macho el 26 de abril de 2012 (D. Trujillo).

TARABILLA EUROPEA*Saxicola rubicola*

Canarias. En Fuerteventura, una en el barranco de la Torre, Antigua, y otra en el campo de golf de Las Playitas, Tuineje, el 9 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

ROQUERO ROJO*Monticola saxatilis*

Un ave en fechas tempranas y en área urbana, en la zona del camino de los Almendrales, Málaga, el 29 de marzo de 2012 (J. L. Ruz).



Carricerín común *Acrocephalus schoenobaenus*. Tegui (Lanzarote). Foto: Juan Sagardía.

ZORZAL COMÚN*Turdus philomelos*

Segundo caso de cría probable en Extremadura: un macho cantor y territorial en el campamento Carlos V, Jerte, Cáceres, a lo largo del mes de junio de 2012. El anterior caso de cría probable se remonta a 1999, en Descargamaría, Cáceres (I. Solana).

ZORZAL ALIRROJO*Turdus iliacus*

Canarias. En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tegui el 8 de marzo de 2012 (J. Sagardía).

BUSCARLA UNICOLOR*Locustella luscinioides*

Baleares. Se sospecha que puede estar criando en la albufera de Mallorca. En 2010 se había detectado una en la zona del camino de los Polls, el 7 de julio (P. Vicens/AOB), mientras que en 2011 se realizan varias observaciones en época apropiada: dos machos cantando en la zona del camino de los Polls el 1 y 13 de abril y 18 de mayo de 2011 (M. Rebassa/AOB), y cinco aves en distintas zonas: una cantando el 1, 7 y 13 de abril en la zona de los Polls del Moviment; otra cantando el 13 de abril en las Punes; además se escucha una el 6 de mayo en el Colombar y se detectan dos machos cantando el 7 de mayo en los Rotlos (P. Vicens/AOB).

CARRICERÍN REAL*Acrocephalus melanopogon*

En la albufera de Valencia: al menos 6 aves en la mata de El Fangaret el 16 de enero de 2009 (J. I. Dies), cifra destacada de capturas para su anillamiento con un total de 12 ejemplares anillados en la R. N. de la Pipa el 7 de julio de 2010 (P. Vera y X. Costa), y hasta 8 aves cantando en la R. N del Tancat de Milia, Sollana (T. Alcocer).

CARRICERÍN COMÚN*Acrocephalus schoenobaenus*

Canarias. En Lanzarote, paso destacado en marzo de 2012: en el campo de golf de Tías tres el día 9 y ese mismo día al menos siete aves en el campo de golf de Tegui (J. Sagardía); alrededor

de 30 aves en el campo de golf de Tías los días 10, 11 y 12 de marzo, así como el 20 de marzo (F. J. García Vargas y J. Sagardía), y un ave en Montaña Blanca, San Bartolomé, el día 12 (J. Sagardía), otra en el Jardín del Cactus, Tegui, el día 17 (F. J. García Vargas) y más de diez aves en una granja en el Jable de Famara, Tegui, el 20 de marzo de 2012 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, dos aves en La Muley, Antigua, el 9 de marzo de 2012, y dos en El Tarajalillo, Tuineje, el 10 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

CARRICERÍN CEJUDO

Acrocephalus paludicola

Se confirma zona de paso en la dehesa y las graveras de Fuentecantos, Soria: primeras observaciones el 7 de agosto de 2012 con dos ejemplares y últimas el 16 de agosto de 2012 con otros dos individuos (J. L. Hernández y J. Ruiz). Entre estas fechas se desarrollaron cinco jornadas de anillamiento y se capturaron 17 aves (V. Salvador Vilariño y J. Ruiz).

CARRICERO COMÚN

Acrocephalus scirpaceus

Baleares. En Menorca, se confirma la cría en la albufera del Grau, Maó, con la captura para anillamiento de una hembra con placa incubatriz el 7 de junio de 2011 y se estima un mínimo de tres parejas en esta localidad después de más de 20 años sin hacerlo (X. Méndez y E. Garriga/AOB).

Canarias. En Fuerteventura, uno alimentándose en un arbusto del campo de golf de Caleta de Fuste, Antigua, el 9 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

ZARCERO BEREBER

Iduna opaca

Dos aves en el embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, el 30 de mayo de 2012 (E. del Viejo, F. Montaña y A. Ruiz). Un joven del año capturado para anillamiento en el Azud del Guadiana, Badajoz, el 14 de julio de 2012 (A. T. Mejías). Un ave en las lagunas de Villafáfila, Zamora, los días 13 y 14 de mayo de 2012 (J. Hernández y X. Piñeiro).

Baleares. En la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, dos adultos son anillados el 12 de mayo de 2011 (R. Escandell, A. García y S. Saiz/AOB).

CURRUCA TOMILLERA

Sylvia conspicillata

Baleares. Durante los pasos migratorios, en Mallorca, una hembra el 12 de mayo de 2011 en el monte de Sa Morisca, Calvià, y otra hembra en el embalse de Cúber, Escorca, el 27 de mayo de 2011 (P. A. Garnett/AOB). Dos adultos y dos jóvenes del año en el cabo de Cavalleria, Es Mercadal, Menorca, el 7 de julio de 2011 (X. Méndez/AOB).

CURRUCA MIRLONA

Sylvia hortensis

Baleares. Un macho adulto en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 28 de abril de 2011 (X. Méndez, A. Salmerón y X. Benito/AOB). Un macho de segundo año es capturado para anillamiento en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 13 de mayo de 2011 (R. Escandell, A. García, S. Saiz y E. Garriga/AOB). Una hembra adulta capturada para anillamiento en Cabrera el 5 de septiembre de 2011 (J. M. González/AOB).

MOSQUITERO PAPIALBO

Phylloscopus bonelli

Canarias. En Lanzarote, uno cerca del campo de golf de Tegui el 31 de marzo de 2012 (F. J. García Vargas) y de nuevo en ese lugar, uno el 4 de abril de 2012 (J. Sagardía). En Fuerteventura, un



Mosquitero papialbo *Phylloscopus bonelli*. Tegui (Lanzarote). Foto: Juan Sagardía.

ejemplar en el Barranco de la Torre, Antigua, el 22 de abril de 2012 (V. R. Cerdeña).

MOSQUITERO IBÉRICO

Phylloscopus ibericus

Baleares. En la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, se destaca un buen paso prenupcial con ocho ejemplares anillados entre el 1 y 12 de abril de 2011 (R. Escandell/AOB). En Cabrera, un ave los días 20 y 26 de octubre de 2011 (E. Amengual y X. Llabrés/AOB).

MOSQUITERO COMÚN

Phylloscopus collybita

Baleares. En Mallorca, destaca la presencia primaveral en 2011, un ejemplar emitiendo canto el 25 de junio en la fuente de S' Aritja, Escorca, (R. Mas/AOB), y un individuo el 17 de junio en el monte Massanella, Escorca (J. M. González/AOB).

MOSQUITERO MUSICAL

Phylloscopus trochilus

Canarias. En Fuerteventura, paso excepcional contándose más de 100 ejemplares en el Barranco de la Torre, Antigua, el 9 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

REYEZUELO LISTADO

Regulus ignicapilla

Baleares. En Cabrera, un récord de longevidad: se trata de la recuperación el 1 de noviembre de 2011 de una hembra anillada como joven hace cuatro años y medio (octubre de 2007) en la misma isla (R. Escandell/AOB).

PAPAMOSCAS CERROJILLO

Ficedula hypoleuca

Canarias. En Gran Canaria, nuevos datos en la Reserva Natural Integral de Inagua, en el interior de la isla, que complementan las de *Ardeola*, 58(1) en dicho enclave: el 6 de septiembre de 2012 cerca del aula de la naturaleza se observa un ave; el día 13 de ese mismo mes tres ejemplares en El Agujero, dos en Yescas, uno en Alsándara y otro en Morro de la Negra (D. Trujillo).

BIGOTUDO

Panurus biarmicus

En el embalse de Arrocampo, Cáceres, un ejemplar el 4 de abril de 2012 (S. Mayordomo y J. L. Guisado) y un macho el 10 de mayo (M. Kelsey). Primeros registros para la provincia de Burgos: en la laguna de Atapuerca se observan dos aves, macho y hembra jóvenes, el 19 de julio de 2012 (M. Suárez), cinco ejemplares incluyendo un macho adulto el 25 de julio, y dos juveniles y una hembra el 27 de julio (J. Otal).

HERRERILLO COMÚN

Cyanistes caeruleus

El 14 de diciembre de 2003, entre Palacio de Torío y Ruiforco de Torío, León, se observa un ejemplar sobre un rosal silvestre *Rosa canina* abriendo con el pico una agalla provocada por el himenóptero (Cynipidae) *Diplolepis rosae* para alimentarse de las larvas que contienen. Estas larvas están muy escondidas en el interior de la agalla, lo que implica que el ave debe saber que el alimento está dentro. No se han encontrado referencias bibliográficas sobre este comportamiento (Á. Hernández Lázaro).

OROPÉNDOLA EUROPEA

Oriolus oriolus

Canarias. Paso prenupcial. En Lanzarote, en el campo de golf de Tegui, grupo de 6 ó 7 aves el 23 de abril de 2012 (J. Sagardía). En Fuerteventura, dos aves en el campo de golf de Caleta de Fuste, Antigua, y una en el Barranco de la Torre, Antigua, el 9 de marzo de 2012 (M. Cabrera). En El Hierro, primera cita: el 14 de mayo de 2012 en Frontera se captura y fotografía una hembra exhausta que tras ser debidamente atendida se libera al día siguiente en el mismo lugar (D. Trujillo, M. Á. Rodríguez y C. Padrón).

ALCAUDÓN DORSIRROJO

Lanius collurio

En 2012 se constata la cría segura por primera vez en la provincia de Salamanca: en la dehesa de Candelario, donde ya se había observado en 2011, se observan dos pollos el 22 de julio (J. La-

bra) y una pareja y cinco juveniles el 6 de agosto (Ch. Diu Castro y R. Montero). En el Puerto de Tornavacas, Ávila-Cáceres, se localizan tres territorios el 2 de agosto de 2012: uno en el lado cacereño con dos juveniles y otros dos en Ávila con una pareja de adultos y dos juveniles respectivamente; es la primera vez que se confirma la reproducción en la parte cacereña de este paraje (J. Prieta).

ALCAUDÓN REAL

Lanius meridionalis

Baleares. Un individuo en Can Cullerassa en la Albufereta, Pollença, Mallorca, el 27 de octubre de 2011, única cita para Baleares (M. Rebassa/AOB).

ALCAUDÓN COMÚN

Lanius senator

Un juvenil en La Cruz, Lena, Asturias, el 2 de septiembre de 2012 (M. Quintana y C. Ovín).

Baleares. Un ave en plena época invernal en el camino de Binifabini, Alaior, Menorca, el 12 de enero de 2011 (R. Escandell/AOB).

CHOVA PIQUIRROJA

Pyrhocorax pyrrhocorax

Baleares. En Mallorca: un ave en el monte Masanella, Escorca, el 1 de diciembre de 2011, y otro ejemplar se escucha en el monte S'Esclop, Andratx, el 21 de diciembre de 2011 (J. M. González/AOB). En Menorca, se observa un ejemplar a partir del 25 de enero de 2011 hasta casi finales del invierno en Rafalet, Sant Lluís (A. Juan/AOB).

GRAJILLA OCCIDENTAL

Corvus monedula

Baleares. Un individuo en el campo de golf de Santa Ponça, Calvià, Mallorca, el 18 de septiembre de 2011 (M. Rebassa y D. García/AOB).

CORNEJA NEGRA

Corvus corone

Observaciones fuera del área de distribución conocida: primer registro en la comarca de Las Vi-

luercas, Cáceres, con un ave en Alía el 17 de agosto de 2012 (J. A. Herrera y J. Cerezo) y tres aves en la finca La Mediana, Vejer de la Frontera, Cádiz, el 22 de septiembre de 2012 (F. Chiclana).

CUERVO GRANDE

Corvus corax

Baleares. En Formentera no se detecta la especie en 2011, y parece que se puede dar por extinguido desde 2010; en los años anteriores había un ejemplar solitario. Se supone que la disminución de los rebaños de ovejas y cabras, la progresiva clausura del basurero del cabo de Barbaria (fuente de alimentación), la persecución directa (caza y veneno) o las molestias durante la reproducción por la práctica de escalada en los acantilados costeros de la Mola, podrían haber contribuido a su extinción (J. Folch y B. Klahr/AOB).

ESTORNINO NEGRO

Sturnus unicolor

Baleares. Nueva especie reproductora para Mallorca con la localización de dos colonias: en Can Cullerassa, en la Albufereta, Pollença, se observa a partir del 15 de mayo de 2011 a cuatro ejemplares (L. Ventoso, S. Quintanilla, G. Bernat y J. J. Bazán); el 5 de junio de 2011 siete adultos posados en un cable eléctrico, dos de ellos llevando comida en el pico a los nidos que están debajo de la tejas del edificio (M. Rebassa/AOB). La otra localidad es el polígono de Son Oms, Palma, con un máximo de 22 ejemplares el 17 de mayo de 2011, con aporte de ramitas a los nidos (M. McMinn/AOB).

OBISPO CORONIGUALDO

Euplectes afer

Reproducción en Extremadura: en los arrozales de Gévora-Valdebotoa, Badajoz, junto a la frontera portuguesa, se localizan dos pequeñas áreas de cría, en una se observan dos machos territoriales el 18 de agosto de 2012 y en otra un macho territorial y dos hembras el 23 de septiembre. Hasta ahora sólo se conocía la cría en la parte portuguesa, donde en 2012 se han observado más de 20 machos adultos (A. Fernández). Fuera del área conocida en Extremadura: un macho en un

maizal entre Montijo y Pueblonuevo del Guadiana, Badajoz, el 19 de agosto de 2012 (Á. Sánchez) y otro macho en arrozales de Guadiana del Caudillo, Badajoz, el 11 de septiembre de 2012; según los agricultores en la zona se ven varios ejemplares (P. Herrador).

ESTRILDA COMÚN

Estrilda astrild

Fuera de la zona habitual en Extremadura: cinco aves en el embalse de Arrocampo, Cáceres, el 5 de agosto de 2012 (M. García del Rey y J. Briz).

Baleares. En la albufera de Mallorca se cuenta un máximo de 20 ejemplares el 20 de junio de 2011 y 51 ejemplares el 24 de noviembre de 2011 (P. Vicens y N. Riddiford/AOB).

PINZÓN VULGAR

Fringilla coelebs

Canarias. En Fuerteventura, cuatro aves, una solitaria y tres agrupadas, en el bosque de casuarinas existente en la Cañada del Río, Pájara, el 14 de marzo de 2012 (M. Cabrera).

VERDERÓN COMÚN

Chloris chloris

Canarias. En El Hierro, en los alrededores de la fuente de La Llanía, Frontera, el 25 de marzo de 2012 se observan dos ejemplares en vuelo (D. Trujillo).

JILGUERO EUROPEO

Carduelis carduelis

Canarias. Dato de nidificación en La Gomera, en localidad dentro de cuadrícula donde se consideraba de reproducción probable (véase Lorenzo, 2007): el 26 de abril de 2012 en Valle Gran Rey se localizan siete nidos emplazados en ramas de varios árboles benjamines *Ficus benjamina* a alturas entre 3,5 m y 5,5 m; dos de ellos tenían excrementos recientes de pollos, uno estaba en construcción y otro se hallaba abandonado, y se desconoce el estado de los tres restantes (D. Trujillo).



Escribano nival *Plectrophenax nivalis*. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Foto: José García-Pozuelo Ramos.

PIQUITUERTO COMÚN

Loxia curvirostra

El 6 de enero de 2012, en un pinar de *Pinus sylvestris* en Matueca de Torío, León, se observan varios grupos, algunos con jóvenes, incluyendo un caso de ceba. Se trata de un caso de cría en pleno invierno. Estos pinares de repoblación han sido colonizados recientemente, al menos desde 2010, existiendo ahora una población numerosa y sedentaria (Á. Hernández Lázaro).

CAMACHUELO TROMPETERO

Bucanetes githagineus

Reproducción en la región de Murcia: en 2012 se confirma la cría de al menos 10 parejas en los barrancos de Mahoya y rambla de la Parra, Abanilla, avistándose hasta 6 parejas al mismo tiempo, y en otra ocasión un bando de 25 individuos —en la zona solo se conocían observaciones previas en 2001, 2002 y 2003—; de nuevo, vistos algunos ejemplares en 2006 por un cazador, y en 2008, pero no había datos ni registros de cría. La zona corresponde a ramblas con escasa cobertura vegetal y presencia de agua muy escasa en la época estival (A. Ruiz Rocamora, E. López Campillo, F. Rocamora y A. J. Hernández Navarro).

Baleares. En Cabrera, un ejemplar, posiblemente una hembra adulta, el 13 de abril de 2011 (J. L. Martínez/AOB). Una hembra adulta es anillada en la isla del Aire, Sant Lluís, Menorca, el 2 de mayo de 2011 (I. Pelegri y L. Bence/AOB).

ESCRIBANO NIVAL

Plectrophenax nivalis

Un ejemplar en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 3 de marzo de 2012 (Anapri).

Baleares. Un ave en el santuario de San Salvador, Felanitx, Mallorca, el 23 de mayo de 2011 (G. Oliver/AOB).

BIBLIOGRAFÍA

- BAALOU DJ, A., SAMRAOUI, F., LAQUAR, A., BENOUGHIDEN, M., HASNI, J., BOUCHAHDANE, I., HHALED, H., BENSOUILAH, S., ALFARHAN, A. H. y SAMRAOUI, B. 2012. Dispersal of yellow-leg gulls *Larus michahellis michahellis* ringed in Algeria: a preliminary analysis. *Ardeola*, 59: 137-144.
- GONZÁLEZ, J. M., REBASSA, M., VENTOSO, L., LÓPEZ-JURADO, C., MÉNDEZ, X., GARRIGA, E., DE PABLO, F., GARCÍA, O. y MARTÍNEZ, O. 2012. *Registres Ornitològics 2011. Anuari Ornitològic de les Balears, 2011*. Vol. 26: 111-254. GOB. Palma. (AOB).

GUTIÉRREZ, R., DE JUANA, E. y LORENZO, J. A. 2012. *Lista de las aves de España*. Edición de 2012. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

LÓPEZ-JURADO, C., GARCÍA-FEBRERO, O., HERRERO, C., MARTÍNEZ, O., NICOLLS, S. y REBASSA, M. 2012. Homologació de Rareses Ornitològiques a Balears 2011. *Anuari Ornitològic de les Balears, 2011*. Vol. 26: 97-110. GOB. Palma.

LORENZO, J. A. 2007 (Ed.). *Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-2003)*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.

MAÑEZ, M. y RENDÓN-MARTOS, M. (Eds.). 2009. *El morito, la espátula y el flamenco en España. Población en 2007 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

AGRADECIMIENTOS.—A todas aquellas personas que ceden amablemente sus observaciones y que permiten elaborar este informe. Un agradecimiento especial al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, y especialmente a su Secretario Ricard Gutiérrez por el envío de las citas que llegan desde dicho comité. Además, cabe agradecer el esfuerzo llevado a cabo por Sergio Mayordomo en la recopilación de registros en Extremadura y por Agustín Carretero (SEO/BirdLife) al revisar y mejorar la edición.