



Tipificaciones en la familia Lauraceae de la Flora del Paraguay

Authors: Ramella, Lorenzo, and Barriera, Gabrielle

Source: Candollea, 73(1) : 109-113

Published By: The Conservatory and Botanical Garden of the City of Geneva (CJBG)

URL: <https://doi.org/10.15553/c2018v731a11>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

Tipificaciones en la familia Lauraceae de la Flora del Paraguay

Lorenzo Ramella & Gabrielle Barriera

Abstract

RAMELLA, L. & G. BARRIERA (2018). Typifications in the Lauraceae family of the Flora of Paraguay. *Candollea* 73: 109-113 In Spanish, English and Spanish abstracts. DOI: <http://dx.doi.org/10.15553/c2018v731a11>

The typification of 15 names described in the *Lauraceae* family from Paraguayan collections in the genera *Aiouea* Aubl., *Nectandra* Rottb., *Ocotea* Aubl., *Oreodaphne* Nees & Mart. and *Phoebe* Nees is presented. Lectotypes are designated for: *Nectandra lanceolata* var. *paraguariensis* Hassl., *Ocotea confusa* Hassl., *Ocotea gracilipes* Mez, *Ocotea lanceolata* f. *latifolia* Hassl., *Ocotea suaveolens* var. *robusta* Hassl. and *Oreodaphne suaveolens* Meisn. A second step lectotypification is made for *Nectandra megaphylla* Hassl.

Resumen

RAMELLA, L. & G. BARRIERA (2018). Tipificaciones en la familia Lauraceae de la Flora del Paraguay. *Candollea* 73: 109-113. En español, resúmenes en inglés y español. DOI: <http://dx.doi.org/10.15553/c2018v731a11>

Se tipifican 15 nombres descritos en la familia *Lauraceae* a partir de colecciones de Paraguay en los géneros *Aiouea* Aubl., *Nectandra* Rottb., *Ocotea* Aubl., *Oreodaphne* Nees & Mart. y *Phoebe* Nees. Seis lectótipos son designados: *Nectandra lanceolata* var. *paraguariensis* Hassl., *Ocotea confusa* Hassl., *Ocotea gracilipes* Mez, *Ocotea lanceolata* f. *latifolia* Hassl., *Ocotea suaveolens* var. *robusta* Hassl. y *Oreodaphne suaveolens* Meisn. Una lectotipificación de segundo paso se realiza para *Nectandra megaphylla* Hassl.

Keywords

LAURACEAE – *Aiouea* – *Nectandra* – *Ocotea* – *Oreodaphne* – *Phoebe* – Paraguay – Typification

Dirección de los autores:

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, C.P. 71, 1292 Chambésy, Suiza. E-mail: florapara@ville-ge.ch

First published online on June 25, 2018.

ISSN: 0373-2967 – Online ISSN: 2235-3658 – *Candollea* 73(1): 109-113 (2018)

© CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE GENÈVE 2018

Introducción

La publicación de la familia *Lauraceae* de la Flora del Paraguay (BERNARDI, en preparación) hace necesario la tipificación de todos los nombres descritos a partir de colecciones de Paraguay en esta familia. Para tal propósito, identificamos el material original de cada uno de estos nombres. Designamos 6 lectótipos y en un caso realizamos una lectotipificación de segundo paso. Los nombres aceptados en la Flora se han indicado usando negritas. Se encontraron las consideraciones taxonómicas utilizadas para la redacción de esta familia en una nota separada (BERNARDI, 2018).

Tipificaciones

Aiouea hassleri Mez in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 3: 229. 1903.

Holotypus: PARAGUAY. **Canindeyú:** “In campo Ipé hú”, X.1898-1899, Hassler, E. 5004 (G [G00229914]!; iso-: G [G00228277, G00228278]!).

= *Aiouea trinervis* Meisn. in A. DC., Prodr. 15(1): 83. 1864.

Nectandra briquetii Hassl. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 21: 93. 1919.

Holotypus: PARAGUAY. **Amambay:** “In altaplanitie Sierra de Amambay. Orilla mont. Limeira”, VI.1912-1913, Hassler, E. 11247 (G [G00228405]!; iso-: A, BM, F, G [G00228406, G00228407, G00228408]!, K, MPU, P).

Notas. – Se indica en VAN DER WERFF et al. (2015: 49) la necesidad de lectotipificar entre los pliegos de la colección Hassler 11247 conservados en G. El espécimen [G00228405] es claramente la colección original en la cual figuran tanto los elementos diagnósticos como un análisis ilustrado de las partes florales de la mano del autor. Se trata por lo tanto del holótipo y una lectotipificación es aquí superflua.

Nectandra dubia Hassl. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 21: 97. 1919.

Holotypus: PARAGUAY. **Amambay:** “In altaplanitie Sierra de Amambay”, X.1912-1913, Hassler, E. 11984 (G [G00228438]!).

= *Ocotea catharinensis* Mez in Bot. Jahrb. Syst. 30, Beibl. 67: 19. 1901.

Nectandra lanceolata var. *grandifolia* Mez in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 3: 794. 1903.

Lectotypus (primer paso: ROHWER, 1993: 225; segundo paso: VAN DER WERFF et al., 2015: 47): **PARAGUAY. San Pedro:** “In silva pr. fl. Corrientes”, IX.1898-1899, Hassler, E. 4484 (G [G00228372]!; islecto-: BM [BM000947267] foto!, F [V0061510F] foto!, G [G00228371, G00228373, G00228374]!, GH [GH00041944, GH00041945] foto!, K [K000576200] foto!, NY [NY00355460] foto!, P [P00711031, P00711032] foto!). **Syntypus:** PARAGUAY. **Canindeyú:** “In dumeto pr. Igatimi”, X.1898-1899, Hassler, E. 4876 (G [G00228378]!; isosyn-: BM [BM000092851] foto!, G [G00228375, G00228376, G00228377]!, K [K000576201] foto!, NY [NY00355461] foto!, P [P00711029] foto!).

= *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. in Linnaea 8: 47. 1833.

Nectandra lanceolata var. *paraguariensis* Hassl. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 21: 92. 1919.

Lectotypus (in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Canindeyú:** “In dumeto pr. Igatimi”, X.1898-1899, Hassler, E. 4876 (G [G00228378]!; islecto-: BM [BM000092851] foto!, G [G00228375, G00228376, G00228377]!, K [K000576201] foto!, NY [NY00355461] foto!, P [P00711029] foto!). **Syntypus:** PARAGUAY. **San Pedro:** “In silva pr. fl. Corrientes”, IX.1898-1899, Hassler, E. 4484 (G [G00228372]!; isosyn-: BM [BM000947267] foto!, F [V0061510F] foto!, G [G00228371, G00228373, G00228374]!, GH [GH00041944, GH00041945] foto!, K [K000576200] foto!, NY [NY00355460] foto!, P [P00711031, P00711032] foto!).

= *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. in Linnaea 8: 47. 1833.

Notas. – Dos sintipos (Hassler 4484 y Hassler 4876) fueron utilizados para la descripción de *N. lanceolata* var. *grandifolia* Mez (1903) y *N. lanceolata* var. *paraguariensis* Hassl. (1919). La lectotipificación de la var. *grandifolia* en base a la colección Hassler 4484 permite utilizar el segundo sintipo disponible (Hassler 4876) como lectótipo de la var. *paraguariensis*. Esta última variedad no es por lo tanto ilegítima contrariamente a lo indicado por ROHWER (1993: 225).

Nectandra lanceolata var. *parvifolia* Mez in Bull. Herb. Boissier ser. 2, 3: 794. 1903.

Holotypus: PARAGUAY. **Canindeyú:** “In silva pr. Curuguaty”, IX.1898-1899, Hassler, E. 4590 (G [G00228368]!; iso-: BM, G [G00228367, G00228369, G00228370]!, K, L, NY, P).

= *Nectandra lanceolata* Nees & Mart. in Linnaea 8: 47. 1833.

Notas. – El holótipo de *N. lanceolata* var. *parvifolia* Mez es idéntico a la lectotipificación superflua efectuada por VAN DER WERFF et al. (2015: 47). La descripción original indica claramente una única colección (*Hassler 4590*) y en G se puede perfectamente determinar la colecta [G00228368] que conforma el material original con las características de la diagnosis.

Nectandra megaphylla Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 92. 1919.

Lectotypus (primer paso: ROHWER, 1993: 196; segundo paso: in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Amambay:** “Sierra de Amambay in via silvatica Picada Esperanza”, VIII.1907-1908, *Hassler, E. & T. Rojas 10584* (G [G00228418]!; isolecto-: A [A00041951] foto!, B [B100185040] foto!, BM [BM000092844] foto!, F [F0061511F] foto!, G [G00228416, G00228417]!, K [K000642330] foto!, NY [NY00355472] foto!, P [P00711038, P00711039, P00711040] foto!, S [S-R-7220] foto!). **Syntypus:** **PARAGUAY. Amambay:** “In altaplantie Sierra de Amambay, entre R. Dorado y Sto. Tomas”, VIII.1912-1913, *Hassler, E. 11295* (G [G00228421]!; isosyn-: BM, F, G [G00228419, G00228420]!, GH, K, NY, P).

Notas. – ROHWER (1993: 196) designó la colección *Hassler & Rojas 10584* como lectótipo, pero sin especificar el espécimen original. Lo designamos formalmente aquí.

Nectandra membranacea f. *floribunda* Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 96. 1919.

Holotypus: **PARAGUAY. Amambay:** “Sierra de Amambay ad margines humidas silvarum pr. Esperanza”, VII.1907-1908, *Hassler, E. & T. Rojas 10529* (G [G00228280]!; iso-: G [G00228291, G00228292, G00228864]!, MO, NY).

= *Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart. in *Linnaea* 8: 48. 1833.

Notas. – Se indica en VAN DER WERFF et al. (2015: 49) la necesidad de lectotipificar entre los pliegos de la colección *Hassler & Rojas 10529* conservados en G. El espécimen [G00228280] es claramente la colección original en la cual figura un análisis ilustrado de las partes florales de la mano del autor. Se trata por lo tanto del holótipo y una lectotipificación es aquí superflua.

Ocotea confusa Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 82. 1919.

Lectotypus (in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Amambay:** “Sierra de Amambay in campis altis arenosis Cerro Cora”, VI.1908, *Hassler, E. & T. Rojas 10477* (G [G00228490]!; isolecto-: BM [BM000092796] foto!, G [G00228487, G00228488, G00228489]!, K [K000602328] foto!, MO [MO247559] foto!, NY [NY00355588] foto!, P [P00756988, P00756989, P00756990] foto!, US [US00048574] foto!). **Syntypus:** **PARAGUAY. San Pedro:** “In campo Apépú (Tapiraguay)”, VIII.1898-1899, *Hassler, E. 4362* (G [G00228497]!; isosyn-: A, F, G [G00228496, G00228498, G00229969]!, K, MO, NY, P, S); “In campo Apépú (Tapiraguay)”, VIII.1898-1899, *Hassler, E. 4362a* (G [G00228500]!; isosyn-: G [G00228499, G00228501, G00229968]!, K). **Alto Paraná:** “In campo pr. fl. Capibary”, XII.1898-1899, *Hassler, E. 5900* (G [G00228492]!). **Canindeyú:** “In campo Ipé hú Sierra Maracayú”, X.1898-1899, *Hassler, E. 4941* (G [G00228494]!; isosyn-: G [G00228493, G00228495, G00229967]!, K, NY, P).

= *Ocotea densiflora* (Meisn.) Mez in *Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin* 5: 301. 1889.

Notas. – El espécimen *Hassler & Rojas 10477* [G00228490] es el único sintipo que cuenta con una diagnosis detallada de la mano de Hassler, razón por la cual lo elegimos como lectótipo.

Ocotea gracilipes Mez in *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 3: 71. 1906.

= *Ocotea lanceolata* var. *gracilipes* (Mez) Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 85. 1919.

Lectotypus (in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Caaguazú:** “In viciniis Caaguazú”, III.1905, *Hassler, E. 9165a* (B [B100185324] foto!; isolecto-: BM [BM000092861] foto!, G [G00228565, G00228566, G00228567]!, K [K000352470] foto!, NY [NY00355609] foto!, P [P00756905] foto!). **Syntypus:** **PARAGUAY. Caaguazú:** “In viciniis Caaguazú”, III.1905, *Hassler, E. 9165* (B [B100185325] foto!; isosyn-: A, BM, G [G00228560, G00228561, G00228562, G00228563, G00228564]!, K, MPU, NY, P).

Notas. – De acuerdo al protólogo, el material original se encuentra en el herbario de Berlín (B).

Ocotea lanceolata f. *latifolia* Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 85. 1919.

Lectotypus (in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Amambay**: “In altaplanitie et declivibus Sierra de Amambay”, XI.1907-1908, *Hassler, E. & T. Rojas 10834* (G [G00228594]!; isolecto-: B [B100185296] foto!, MPU [MPU018857] foto!, P [P00756815, P00756816] foto!). **Syntypus**: **PARAGUAY. Amambay**: “Sierra de Amambay silvulas formans in arenosis pr. Cerro Corá”, VI.1907-1908, *Hassler, E. & T. Rojas 10476* (G [G00228590]!; isosyn-: B [B100185298] foto!, G [G00228587, G00228588, G00228589]!, K [K000352468] foto!).

= *Ocotea floribunda* (Sw.) Mez in *Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin* 5: 325. 1889.

Notas. – La colección *Hassler & Rojas 10834* designada aquí como lectótipo, presenta las características descritas para la f. *latifolia* en el protólogo de Hassler: “*foliis lanceolatis cum ovato-ellipticis in eodem specimine, 85/25-95/45 mm*”, y esto de manera general en todos los especímenes conservados en G, B, MPU y P. El material original, parte de la colección personal de Hassler conservada en G, lleva una nota del autor en la etiqueta: “*Ocotea lanceolata* (Nees) forma fol. latioribus”. Agrega: “*A Mez surreptam*”, lo que indicaría que se trata de un ejemplar parcial, el resto habiendo quedado en las manos de Mez. El otro sintipo, *Hassler & Rojas 10476*, presenta hojas lanceolados sin la presencia en el mismo ejemplar de hojas ovadas-elípticas con las proporciones indicadas en el protólogo. Esta característica es compartida entre todos los sintipos consultados (B, G, K).

Ocotea pseudocorymbosa Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 87. 1919.

Holotypus: **PARAGUAY. Amambay**: “In altaplanitie Sierra de Amambay. Ñuvera”, XI.1912-1913, *Hassler, E. 11416* (G [G00228503]!; iso-: A, BM, F, G [G00228502, G00228504]!, MPU, NY, P).

= *Ocotea diospyrifolia* (Meisn.) Mez in *Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin* 5: 374. 1889.

Notas. – El holótipo *Hassler 11416* es considerado por VAN DER WERFF et al. (2015: 51) como sintipo lo cual es erróneo, puesto que la descripción original menciona una sola colecta como tipo. El hecho de tener varios especímenes en G de esta misma colección no permite considerarlos como sintipos, puesto que se puede fácilmente identificar el material original [G00228503] por contar con una descripción diagnóstica y el análisis floral ilustrado de la mano del autor.

Ocotea suaveolens var. *robusta* Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 90. 1919.

Lectotypus (in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Cordillera**: “Paraguaria centralis: in regione lacus Ypacaray. S. Bernardino”, X.1913, *Hassler, E. 12310* (G [G00228898]!; isolecto-: B [B100185427] foto!, F [V0061660F] foto!, G [G00228897]!, US [00997597] foto!). **Syntypi**: **PARAGUAY. Cordillera**: “Itacurubí-Unión”, VI.1898, *Endlich, R. 239* (G [G00228854]!); “In silvis virgineis Cordillera de Altos”, X.1895, *Hassler, E. 1342* (G [G00228873]!; isosyn-: G [G00228872, G00228874]!); “Ad marginem paludis pr. San Bernardino”, X.1885-1895, *Hassler, E. 1367* (G [G00228875]!; isosyn-: G [G00228876, G00228877]!); “Paraguaria centralis: in regione lacus Ypacaray. Pie Cordilleras”, VII.1913, *Hassler, E. 11803* (G [G00228893]!; isosyn-: B, F, G [G00228894]!, US). **Guairá**: “Itangu, près de Villa-Rica, dans les bois”, 14.X.1874, *Balansa, B. 2016* (G [G00228848]!; isosyn-: G [G00228847, G00228849]!). **Paraguari**: “In silvis montanis pr. Cordillera de Paraguay”, IX.1895, *Hassler, E. 1156* (G [G00228869]!; isosyn-: G [G00228868, G00228870]!, K); “In silvis montanis pr. Cordillera de Paraguay”, IX.1895, *Hassler, E. 1156a* (G [G00228871]!). **Central**: “L’Assomption, dans les bosquets”, IV.1874, *Balansa, B. 2022* (G [G00228852]!; isosyn-: G [G00228850, G00228851]!). **Amambay**: “In altaplanitie Sierra de Amambay”, VII.1912-1913, *Hassler, E. 11653* (G [G00228892]!). **BOLIVIA**: *Rusby, H. H. 2672* (G [G00369447]!; isosyn-: US).

= *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Hieron. in *Bol. Acad. Nac. Ci. Republ. Argent.* 4: 437. 1881.

Notas. – La colección *Hassler 12310* [G00228898] designada aquí como lectótipo además de llevar las características de la diagnosis original, lleva la anotación “*Typus 2010. 1803 etc!*” la cual refiere a una numeración alternativa de este mismo ejemplar figurando en el espécimen, así como también del espécimen de la colección *Hassler 11803* [G00228893]. Esta nota va acompañada de un análisis ilustrado de la flor y estambre por el propio Hassler.

Oreodaphne suaveolens Meisn. in *A. DC., Prodr.* 15(1): 136. 1864.

= *Ocotea suaveolens* (Meisn.) Hieron. in *Bol. Acad. Nac. Ci. Republ. Argent.* 4: 437. 1881.

Lectotypus (in hoc loco designatus): **PARAGUAY. Central**: “Assomption” [fl.], VI.1858, *Gibert, E. J. 56* (K [K000442013] foto!; isolecto-: NY [NY00355784] foto!, P [P00711095] foto!). **Syntypi**: **PARAGUAY. Central**: “Assomption” [fl. gem.], VI.1858, *Gibert, E. J. 74* (K [K000442033] foto!). **Sin indicación del departamento**: “Gd. Chaco” [sterilis], VI.1858, *Gibert, E. J. 21* (K [K000442032] foto!; isosyn-: NY [NY00355785] foto!).

Notas. – De acuerdo al protólogo, el material original se encuentra en el herbario Hooker, ahora en K. De los 3 sintipos elegimos a la colección *Gibert 56*, la única que está en flor.

Phoebe paraguariensis Hassl. in *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève* 21: 79. 1919.

≡ *Cinnamomum paraguariense* (Hassl.) Kosterm. in *Reinwardtia* 6: 22. 1961.

Holotypus: PARAGUAY. **Amambay:** “In altaplanitie Sierra de Amambay. Montes húmedos Sto. Tomas”, VIII.1912-1913, *Hassler, E. 11305* (G [G00228251]!; iso-: A, BM, F, G [G00228252, G00228253, G00228254]!, K, MPU, NY, P, S).

= *Cinnamomum triplinerve* (Ruiz & Pav.) Kosterm. in *Reinwardtia* 6: 24. 1961.

Notas. – El holótipo de *P. paraguariensis* Hassl. es idéntico a la lectotipificación superflua efectuada por ROHDE et al. (2017: 1103). La descripción original indica claramente una única colección (*Hassler 11305*) y en G se puede perfectamente determinar la colecta [G00228251] que conforma el material original por contar con una descripción diagnóstica y el análisis floral ilustrado de la mano del autor.

Referencias

- BERNARDI, L. (2018). Novedades taxonómicas en *Nectandra* Rottb. y *Ocotea* Aubl. (Lauraceae) de la Flora del Paraguay. *Candollea* 73: 105-108.
- BERNARDI, L. (en preparación). Lauraceae. *Fl. Paraguay* 50.
- ROHDE, R., B. RUDOLPH, K. RUTHE, F.G. LOREA-HERNÁNDEZ, P.L. RODRIGUES DE MORAES, J. LI & J.G. ROHWER (2017). Neither *Phoebe* nor *Cinnamomum* - the tetrasporangiate species of *Aiouea* (Lauraceae). *Taxon* 66: 1085-1111.
- ROHWER, J.G. (1993). Lauraceae: *Nectandra*. *Fl. Neotrop. Monogr.* 60.
- VAN DER WERFF, H., C.A. ZANOTTI & J.C. OSPINA (2015). Lauraceae. *Fl. Argentina* 15: 41-57.